

いちご栽培管理 (R4.4.)

(有) 丸 富

3月前半は比較的天気がよく暖かい日が続いたが、後半は寒の戻りや花冷えで曇天が多く、寒い日もあった。上旬以降、気温が上がり、収穫量が急増した。気温上昇により、ダニ、スリップス、アブラムシなどが急激に増えた。

害虫対策

気温が上がると害虫の活動が活発になるので、特にダニ、スリップス、アブラムシなどに注意する。

害虫被害の事前対策として**バイオアクトTS 50~70 cc/10a**を3~5日毎に灌水する。

日頃から害虫対策として**バイオアクトTS 2,000~3,000倍**を防除時に混用する。

軟弱果対策

果実の充実や日持ち促進、品質向上に見合った肥培管理を行う。

品質向上に**時を越えた贈り物 100~200 cc/10a**と**酸カル 100~200 cc/10a**と**サンミネーラ 50~100 cc/10a**を必要に応じて灌水する。

軟弱徒長抑制

軟弱徒長すると、病虫害の発生が多くなる。混み合うと防除効果が低下する。

徒長抑制に**時を越えた贈り物 1,000倍**と**酸カル 1,000倍**と**サンミネーラ 10,000倍**を葉面散布する。

灌水に**酸カル 100~200 cc/10a**と**天然ミネラル 100 cc/10a**と**サンミネーラ 50 cc/10a**を施用する。

病害対策

暖かい雨が降り続き、高温多湿になると、病害の発生が多くなる。特に新月頃は病害に注意する。

抵抗力の強化に**時を越えた贈り物 500倍**(又は**オリゴファイト 2,000倍**)と**天然ミネラル(又は酸カル)1,000倍**と**サンミネーラ 5,000倍**を葉面散布する。

防除時に**時を越えた贈り物 1,000倍**と**天然ミネラル(又は酸カル)2,000倍**と**サンミネーラ 10,000倍**を混用可。

親株管理

果実が実っていると、ランナーの発生が悪いので、早めに花芽を取り除き、ランナー分化を促進する。

根張り促進に**Gバランス DF 5,000倍**と**天地の恵み(又は発根力)1,000倍**を散水する。

育苗培土に**ハイプロ粗粒**を5%混ぜて、**天地の恵み(又は時を越えた贈り物)1,000倍**を散水・灌注する。

追肥(液肥)

施用量は肥料、土質、樹勢、環境などによって加減する。

プロ液肥 1~2ℓ/10a

時を越えた贈り物(又は酸カル) 100~200 cc/10a

サンミネーラ 50~100 cc/10a

バイオアクトTS 50~70 cc/10a

5~7日毎に灌水する場合
※状況に応じて加減する

※サンミネーラの代わりにシカアップ 100~150 cc、天然ミネラル 150~200 cc、海藻のエキス 50g でもよい。

ご注文やお問い合わせは、

有限会社 丸 富 TEL (0942) 65-0123

FAX0942-65-1091 (24時間受付)

携帯 090-3328-7603 (富松まで)