

野菜(トマト・ナス)栽培管理 (R4.3.) (有) 丸 富

2 月前半は曇天が多く寒い日が続いたので、ハウス内は低温傾向だった。後半は好天に恵まれたが、朝晩の冷え込みが厳しく、生育が鈍く、収穫量が伸び悩んだ。三寒四温で徐々に気温が上がり、病害虫の発生が多くなった。

品質向上

地温が上がると、根の働きが活発になり、養分吸収が盛んになるので、草勢が旺盛になる。

軟弱徒長を抑え、品質向上に**酸カル 1,000 倍**と**時越 2,000 倍**と**サンミネーラ 10,000 倍**を葉面散布する。
軟果対策に**酸カル 200 cc/10a**と**時を越えた贈り物 100 cc/10a**と**サンミネーラ 50 cc/10a**を灌水する。

日焼け対策

曇天が続いて軟弱な状態の後に、好天で日差しが強く、急に暑くなったら、果実に日焼け被害が出る。

果実の日焼け対策に**酸カル 1,000 倍**と**天然ミネラル 2,000 倍**と**サンミネーラ 5,000 倍**を数回、葉面散布し、果皮を強化する。日の出後～約 2 時間、果実に結露しないよう環境を制御する。

着色促進

着果負担が続く場合は、できる限り光合成を促進して、着色を促進し、早く収穫する。

着色促進に**笑顔 1,000 倍**と**天然ミネラル 2,000 倍**と**サンミネーラ 10,000 倍**を数回、葉面散布する。
根から**天地の恵み 200 cc/10a**と**天然ミネラル 100 cc/10a**と**サンミネーラ 50 cc/10a**を灌水する。

発根促進

根の働きを活発にし、樹勢回復するために、時々根づくりを行う。

発根促進に **G バランス DF 1 kg/10a**と**天地の恵み 0.5 kg(又は発根力 1 kg)/10a**を 30～45 日毎に灌水する。

病害虫対策

病害虫はハウス周辺の環境にも注意しながら、事前対応で予防する。近日点では害虫の発生が多くなる。

害虫の事前対応として**バイオアクト 50～70 cc/10a**を灌水して、害虫の繁殖を予防する。

防除時に忌避剤として**バイオアクト(又はストッパー雅)2,000～3,000 倍**を混用散布する。(農薬混用可)

追肥(液肥)

土質や生育状況、環境、肥培管理によって増減する。

天地の恵み(又は時を越えた贈り物) 200～300 cc/10a

サンミネーラ 50～70 cc/10a

酸カル(又は天然ミネラル) 100～200 cc/10a

バイオアクト TS 50～70 cc/10a

5～7 日毎に灌注する場合

※生育状況によって加減する。

※サンミネーラの代わりに、シカアップ[®] 100～150 cc、天然ミネラル 150～200 cc、海藻のエキス 50g でもよい。

ご注文やお問い合わせは、

有限会社 丸 富

TEL (0942) 65-0123

FAX0942-65-1091 (24 時間受付)

携帯 090-3328-7603 (富松まで)