

アスパラガス栽培管理(R4.5.)

(有) 丸 富

4 月は比較的天気がよく暖かい日が続いた。しかし、朝晩の冷え込みで伸長や肥大が悪く、収穫量が伸び悩んだ。また、気温上昇や麦の生長に伴い、害虫の発生が多くなり、スリップス、アブラムシなどが増えた。

ピンチ後に

ピンチによるダメージをできる限り早く回復させるために、葉面散布を数回行う。新月後に葉面散布を行うと、樹勢が早く回復する。

ピンチ後に**天地の恵み 500 倍(又は笑顔 1,000 倍)**と**サンミネーラ 10,000 倍**を数回、葉面散布する。

徒長抑制

夏芽を収穫するようになったら、茎葉の緑化を促進し、側枝や二次葉の発生をやや抑制する。

徒長抑制に**酸カル(又は時を越えた贈り物)1,000 倍**と**サンミネーラ 3,000 倍**を葉面散布する。

緑化促進に**天然ミネラル(又は時を越えた贈り物)2,000 倍**と**サンミネーラ 5,000 倍**を葉面散布する。

根張り促進

1 ヶ月に 1 回、根に酸素を供給し、吸収根の働きを活発に維持する。根の働きには酸素が必要。

根張り促進に **G バランス DF 1 kg/10a** と **天地の恵み 0.5 ㍓(又は発根力 1 ㍓)/10a** を灌水する。

転流促進

できる限り光合成を促進して、茎葉で生産した養分を若茎へ転流させる。若茎を早く伸長させて、早く収穫する。

転流促進に**時を越えた贈り物(又は酸カル)1,000 倍**と**サンミネーラ 10,000 倍**を葉面散布する。

※防除時に混用でも可能。

害虫対策

遠日点では害虫の発生は比較的少ないが、周辺の環境変化でハウス内へ害虫が飛び込むので、忌避剤などを活用して、害虫のハウス内への侵入を予防する。

害虫対策に**バイオアクト TS 50~70 cc(又はスッパ-雅 100~200 cc)/10a**を 5~7 日毎に灌水する。

追肥(液肥)

土壌環境、並びに年数、根の働きによっても増減する。

プロ液肥 5~10 ㍓/10a

時を越えた贈り物 100~200 cc/10a

サンミネーラ 50 cc/10a

バイオアクト TS(又はスッパ-雅) 50cc(100cc)/10a

5~10 日ごとに灌水する場合

※収穫量や土壌条件、天候によって加減する。

※サンミネーラの代わりにシカアップ 100~150 cc、天然ミネラル 100~200 cc、海藻のエキス 50g でもよい。

ご注文やお問い合わせは、

有限会社 丸 富 0942 - 65 - 0123 (TEL)

FAX 0942-65-1091 (24 時間受付) 携帯 090-3328-7603 (富松まで)