

いちご栽培管理 (R4.5.)

(有) 丸 富

4月は比較的天気がよく暖かい日が続いた。朝晩が冷えたので果実も硬く、収穫にも適した天候であった。気温上昇に伴い、病害虫の発生が多くなり、ダニ、スリップス、アブラムシ、ウドンコ病などが増えた。

病害対策

暖かい雨が降り続き、高温多湿になると、病害の発生が多くなる。特に新月頃はウドンコ病に注意する。抵抗力の強化に**時を越えた贈り物 500倍(又はオリゴファイト 2,000倍)**と**天然ミネラル(又は酸カル)1,000倍**と**サンミネーラ 5,000倍**を葉面散布する。防除時に**時を越えた贈り物 1,000倍**と**天然ミネラル(又は酸カル)2,000倍**と**サンミネーラ 10,000倍**を混用可。

軟弱果対策

軟弱果対策は果実温度が上がる前に収穫する。果実温度が上がると、果皮が軟くなる。品質向上に**時を越えた贈り物 100~200 cc/10a**と**酸カル 100~200 cc/10a**と**サンミネーラ 50~100 cc/10a**を必要に応じて灌水する。

軟弱徒長抑制

混み合うと薬液が掛かりにくく、防除効果が低下する。徒長抑制に**時を越えた贈り物 1,000倍**と**酸カル 1,000倍**と**サンミネーラ 10,000倍**を葉面散布する。灌水に**酸カル 100~200 cc/10a**と**天然ミネラル 100 cc/10a**と**サンミネーラ 50 cc/10a**を施用する。

害虫対策

周辺環境が変わると、害虫がハウス内へ飛び込んで来る。特にダニ、スリップス、アブラムシなどに注意する。害虫被害の事前対策として**バイオアクトTS 50~70 cc/10a**を3~5日毎に灌水する。日頃から害虫対策として**バイオアクトTS 2,000~3,000倍**を防除時に混用する。

親株管理

これから夏にかけて遠日点だから、ランナーの発生が良いので、安心してランナー分化を促進する。根張り促進に**Gバランス DF 5,000倍**と**天地の恵み(又は発根力)1,000倍**を散水する。育苗培土に**ハイプロ粗粒**を5%混ぜて、**天地の恵み(又は時を越えた贈り物)1,000倍**を散水・灌注する。

追肥(液肥)

施用量は肥料、土質、樹勢、環境などによって加減する。

プロ液肥	1~2ℓ/10a	} 5~7日毎に灌水する場合 ※状況に応じて加減する
時を越えた贈り物(又は酸カル)	100~200 cc/10a	
サンミネーラ	50~100 cc/10a	
バイオアクトTS	50~70 cc/10a	

※サンミネーラの代わりにシカアップ 100~150 cc、天然ミネラル 150~200 cc、海藻のエキス 50g でもよい。

ご注文やお問い合わせは、

有限会社 丸 富 TEL (0942) 65-0123

FAX 0942-65-1091 (24時間受付)

携帯 090-3328-7603 (富松まで)