

いちご栽培管理 (R4.6.)

(有) 丸 富

5 月前半は曇天が多く寒暖差が大きく荒れた天気もあったが、後半は比較的天気がよく暑い日が続いた。高温により害虫の発生が多かった。特に、スリップス、アブラムシ、ウドンコ病などが多かった。

親株管理

苗半作！ 健全な親株から出た良いランナーを採る。良いランナーの発生を促し、良質な苗を育てる。
根張り促進に **G バランス DF 5,000 倍**と**天地の恵み(又は発根力)1,000 倍**を散水する。
ランナーの発生促進に**笑顔(又は天地の恵み)1,000 倍**と**サンミネーラ 10,000 倍**を葉面散布する。

活着促進

ランナーを鉢上げしたら、スムーズに活着するよう、樹勢回復を図る。
活着するまで**笑顔(又は天地の恵み)1,000 倍**と**サンミネーラ 10,000 倍**を葉面散布する。
活着したら**酸カル 1,000 倍**と**天地の恵み 1,000 倍**と**サンミネーラ 10,000 倍**を灌注、又は散水する。

軟弱苗対策

遠日点で軟弱徒長しやすいので、事前対応で健全な苗づくりを行う。
健全な苗づくりに**時を越えた贈り物 2,000 倍**と**酸カル 2,000 倍**と**サンミネーラ 10,000 倍**を必要に応じて葉面散布、又は散水する。

病害対策

高温多湿になると、病害の発生が多くなる。特に新月頃や低気圧通過時は病害の発生に注意する。
抵抗力の強化に**時を越えた贈り物 500 倍(又はオリゴファイト 2,000 倍)**と**天然ミネラル(又は酸カル)1,000 倍**と**サンミネーラ 5,000 倍**を葉面散布する。
防除時に**時を越えた贈り物 1,000 倍**と**天然ミネラル(又は酸カル)2,000 倍**と**サンミネーラ 10,000 倍**を混用可。

害虫対策

周辺環境が変わると、害虫が育苗床へ飛び込んで来る。特にダニ、スリップス、アブラムシなどに注意する。
害虫被害の事前対策として**バイオアクトTS 10,000~20,000 倍**を3~5日毎に灌水、又は散水する。
日頃から害虫対策として**バイオアクトTS 2,000~3,000 倍**を防除時に混用する。

追肥(液肥)

施用量は肥料、土質、樹勢、環境などによって加減する。

プロ液肥	1,000~2,000 倍
時を越えた贈り物(又は酸カル)	1,000~2,000 倍
サンミネーラ	5,000~10,000 倍
バイオアクト TS	10,000~20,000 倍

5~7 日毎に灌水する場合
※状況に応じて加減する

※サンミネーラの代わりにシカアップ 10,000 倍、天然ミネラル 2,000~3,000 倍、海藻のエキス 10,000 倍でもよい。

ご注文やお問い合わせは、

有限会社 丸 富 TEL (0942) 65-0123

FAX0942-65-1091 (24 時間受付)

携帯 090-3328-7603 (富松まで)