

アスパラガス栽培管理(R4.7.)

(有) 丸 富

6 月前半は梅雨入りして、雨が降ったが、後半は異例の早い梅雨明けで猛暑になり、高温障害や生育不良になったがところが多かった。特に、スリップス、アブラムシ、ヨウムシなどが多かった。

高温障害対策

梅雨明け後の猛暑により、品質の低下や病害の発生が多くなる。光合成を促進するために、緑化を促し茎葉の充実を図る。

茎葉の充実促進に**酸カル 2,000 倍**と**天然ミネラル 2,000 倍**と**サンミネーラ 5,000 倍**を葉面散布する。

伸長促進

茎葉で生産した養分を効率よく若茎へ転流させる。若茎を早く伸長させて、早く収穫すると次の若茎が伸長し、増収につながる。

伸長促進に**時を越えた贈り物(又は酸カル)1,000 倍**と**サンミネーラ 10,000 倍**を葉面散布する。

※防除時に混用でも可能。

根張り促進

高温時は土壌中の溶存酸素が低下する。根が活発に働くために酸素が必要。

根張り促進に **G バランス DF 1 kg/10a** と **天地の恵み 0.5 l(又は発根力 1 l)/10a** を灌水する。

徒長抑制

遠日点で徒長傾向の場合は、茎葉の緑化を促進し、側枝や二次葉の発生をやや抑制する。

徒長抑制に**酸カル 1,000 倍**と**サンミネーラ 3,000 倍**を葉面散布する。防除時の混用も可能。

緑化促進に**天然ミネラル(又は時を越えた贈り物)1,000 倍**と**サンミネーラ 5,000 倍**を葉面散布する。

病虫害対策

日頃から健全な株を育成すると、病虫害の発生は比較的少ない。硝酸態窒素が少ない株の育成を日頃から心がける。

病害対策に**時を越えた贈り物 1,000 倍**と**酸カル 1,000 倍**と**サンミネーラ 5,000 倍**を葉面散布する。

害虫対策に**バイオアクト TS 50~70 cc(又はスッパ-雅 100~200 cc)/10a**を5~7日毎に灌水する。

追肥(液肥)

土壌環境、並びに年数、根の働きによっても増減する。

プロ液肥 5~10 l/10a

時を越えた贈り物 100~200 cc/10a

サンミネーラ 50 cc/10a

バイオアクト TS(又はスッパ-雅) 50cc(100cc)/10a

5~10 日ごとに灌水する場合

※収穫量や土壌条件、天候によって
加減する。

※サンミネーラの代わりにシカアップ 100~150 cc、天然ミネラル 100~200 cc、海藻のエキス 50g でもよい。

ご注文やお問い合わせは、

有限会社 丸 富 0942 - 65 - 0123 (TEL)

FAX 0942-65-1091 (24 時間受付) 携帯 090-3328-7603 (富松まで)