

いちご栽培管理 (R4.9.)

(有) 丸 富

8月は線降水帯やゲリラ豪雨などもあり、蒸し暑くすっきりしない天候で、高温、豪雨により根傷みして、ツソ病など病害の発生が多かった。また、一部でスリップスやアブラムシ、ヨウムシなど害虫の発生が多かった。

花芽分化対策

肥料切れし過ぎると、花芽分化が進まないのので、苗の状態を観察しながら、花芽分化対策を行う。

C/N比の向上に**時を越えた贈り物 1,000倍**と**酸カル 1,000倍**と**サンミネーラ 10,000倍**を必要に応じて葉面散布、又は散水する。(定植 20 日前から花芽分化促進を行う。)

発根促進

根が発生する時は酸素が必要だから、発根剤を灌注・散水する時は酸素供給剤と共に施用する。

発根促進に**天地の恵み(又は発根力)1,000倍**と**Gバランス DF 5,000倍**を灌注・散水する。

病害対策

日照不足や低気圧による窒素吸収で、窒素過多になると病害の発生が多くなる。特に台風や低気圧の通過後は雨風による病害の拡散に注意する。

抵抗力の強化に**酸カル 1,000倍**と**K-40 4,000倍**と**サンミネーラ 5,000倍**を葉面散布する。

防除に**時を越えた贈り物 1,000倍**と**酸カル(又は天然ミネラル)2,000倍**と**サンミネーラ 10,000倍**を混用する。

芽なし対策

近日点では窒素消化が盛んになるので、芽なし株の発生が多くなる。健全な苗を育成する。

芽なし対策として、定植 20 日前から肥料が切れ過ぎないように、5 日毎に**天地の恵み 500倍**を灌注・散水する。

害虫対策

近日点では害虫の発生が多くなるので、できる限り事前に防ぐ。特にダニ、ヨウムシなどに注意する。

日頃から害虫対策として**バイオアクトTS 2,000~5,000倍**を防除時に混用する。(高温時は薄めに)

追肥(液肥)

施用量は肥料、土質、樹勢、環境などによって加減する。

プロ液肥	1,000~2,000倍
時を越えた贈り物(又は酸カル)	1,000~2,000倍
サンミネーラ	5,000~10,000倍
バイオアクトTS	10,000~20,000倍

5~7日毎に灌水する場合
※状況に応じて加減する

※サンミネーラの代わりにシリアップ 10,000倍、天然ミネラル 2,000~3,000倍、海藻のエキス 10,000倍でもよい。

ご注文やお問い合わせは、

有限会社 丸 富 TEL (0942) 65-0123

FAX 0942-65-1091 (24 時間受付)

携帯 090-3328-7603 (富松まで)