

いちご栽培管理 (R4.12.)

(有) 丸 富

11月は干ばつ傾向で晴れた日が多く、生育は順調であったが、高温により一部で病害虫の発生も多かった。草勢は徐々に旺盛になり、花粉も多く蜂が良く受粉していた。高温であったが、生育は若干遅れ気味だった。

着色促進

果実は生殖生長で着色しやすいので、株が栄養生長傾向になると、果実の着色が鈍る。観察しながら電照や葉面散布などで生育調整を行う。

着色促進に**笑顔 1,000 倍(天地の恵み 500 倍)**と**サンミネーラ 10,000 倍**を必要に応じて葉面散布する。

発根促進

根は養分散散における優先順位が低いので、着果負担が少ないうちに根を張らせる。

発根促進に**天地の恵み 500 cc(発根力 1ℓ) / 10a**と**G バランス DF 1 kg / 10a**を1ヶ月毎に灌水する。

肥大促進

果実の肥大には刈が必要であるが、刈、苦土、石灰のバランスを考慮した施肥(追肥)が大切。

果実の肥大促進に**K-40 250g / 10a**と**酸カル 200 cc / 10a**と**サンミネーラ 50 cc / 10a**を1ヶ月に2回、灌水する。

病害対策

窒素過多になると病害の発生が多くなる。窒素消化が優れた資材を促し、病害抵抗力を強化する。

抵抗力の強化に**酸カル 1,000 倍**と**K-40 4,000 倍**と**サンミネーラ 5,000 倍**を葉面散布する。

防除に**時を越えた贈り物 2,000 倍**と**酸カル(又は天然ミネラル) 2,000 倍**と**サンミネーラ 10,000 倍**を混用する。

害虫対策

満月頃は害虫の発生が多いので、できる限り事前に防ぐ。特にダニ、ヨリムシなどに注意する。

ネズミ、ダニ、スリップスなどの事前対策として**バイオアクトTS 50~70 cc / 10a**を5~7日毎に灌水する。

追肥(液肥)

施用量は肥料、土質、樹勢、環境などによって加減する。

プロ液肥 5~7ℓ / 10a

時を越えた贈り物(又は酸カル) 100~200 cc / 10a

サンミネーラ 50~100 cc / 10a

バイオアクトTS 50~70 cc / 10a

5~7日毎に灌水する場合
※状況に応じて加減する

※サンミネーラの代わりにシカアップ 100~150 cc、天然ミネラル 200~300 cc、海藻のエキス 50 g でもよい。

ご注文やお問い合わせは、

有限会社 丸 富

TEL (0942) 65-0123

FAX 0942-65-1091 (24 時間受付)

携帯 090-3328-7603 (富松まで)