

# いちご栽培管理

(R5.1.)

(有) 丸 富

12月は冬型の気圧配置となり、雪害や日照不足傾向になったが、生育は順調であった。病害虫の発生はやや多かった。前半は草勢がやや旺盛であったが、後半は連續出蕾や着果負担もあり、徐々に落ち込んでいった。

## 病害対策

遠日点では栄養生長傾向になるので、病害の発生が多くなる。硝酸態窒素を消化し、病害抵抗力を強化する。

病害抵抗力強化に**酸カル 1,000 倍と時を越えた贈り物 2,000 倍とサンミネーラ 5,000 倍**を葉面散布する。

防除に**時を越えた贈り物 2,000 倍と天然ミネラル(又は酸カル)2,000 倍とサンミネーラ 10,000 倍**を混用する。

## 肥大促進

果実が肥大するように、カリ、苦土、石灰のバランスを考慮した施肥（追肥）を行う。

果実の肥大促進に**K-40 250g／10a と酸カル 50～100 cc／10a とサンミネーラ 50 cc／10a**を1ヶ月に2回、灌水する。

## 着色促進

株が栄養生長傾向になると、果実の着色が鈍るので、作物を観察しながら電照や温度管理、葉面散布、追肥などで生育調整を行う。

着色促進に**笑顔 1,000 倍(天地の恵み 500 倍)**と**サンミネーラ 10,000 倍**を必要に応じて葉面散布する。

## 発根促進

着果負担がかかると、根の回復力が低下する。また、地温が下がると、根の養分吸收が低下する。

発根促進に**天地の恵み 500 cc(発根力 1ℓ)／10a と G バランス DF 1 kg／10a**を1ヶ月毎に灌水する。

## 害虫対策

満月頃は着果負担が大きくなり、樹勢低下するので、ダニなど害虫の発生が多くなる。

ネズミ、ダニ、スリップスなどの事前対策に**バイオアクトTS 50～70 cc／10a**を5～7日毎に灌水する。

## 追肥(液肥)

施用量は肥料、土質、樹勢、環境などによって加減する。

|                 |                |                             |
|-----------------|----------------|-----------------------------|
| プロ液肥            | 5～7ℓ／10a       | 5～7日毎に灌水する場合<br>※状況に応じて加減する |
| 時を越えた贈り物(又は酸カル) | 100～200 cc／10a |                             |
| サンミネーラ          | 50～100 cc／10a  |                             |
| バイオアクト TS       | 50～70 cc／10a   |                             |

※サンミネーラの代わりにシリカアップ 100～150 cc、天然ミネラル 200～300 cc、海藻エキス 50 g でもよい。

ご注文やお問い合わせは、

有限会社 丸 富 TEL (0942) 65-0123

FAX 0942-65-1091 (24 時間受付)

携帯 090-3328-7603 (富松まで)