

アスパラガス栽培管理 (R5.2.)

(有) 丸 富

1月上旬は比較的好天に恵まれ、干ばつ傾向でしたが、中旬以降、低気圧や強烈な寒波に見舞われ、雪害や日照不足傾向になった。日照不足で地温の上昇が遅く、萌芽や若茎の伸長に格差があった。

蒸し込み前に

蒸し込み前に、土壤微生物の働きを促進する微生物の餌になる資材や糖類、アミノ酸などを灌水する。
蒸し込み前に**天地の恵み 1ℓ(又はバイオシャイニンググリーン 3ℓ) / 10a** と **天然ミネラル 200 cc / 10a** と **サンミネーラ 50 cc / 10a** を灌水(灌注)する。

萌芽後に

萌芽し出揃ったら、若茎の伸長を促進し、春芽を早く収穫して収穫量を増やす。
若茎の伸長促進に**笑顔 1,000 倍(又は天地の恵み 500 倍)**と**サンミネーラ 10,000 倍**を葉面散布する。

発根促進

根の活性が向上すると、土壤養分の吸収が盛んになる。微生物やアミノ酸の働きを上手に活用する。
発根促進に**天地の恵み(又は発根力) 500 cc / 10a** と **G バランス DF 500g / 10a** を灌水(灌注)する。

病害対策

土壤改良時に**ハイプロ**を表層土に**5~10% 混和して**土を戻す。その後、**酸カル 1,000 倍**と**時を越えた贈り物(又は天地の恵み) 2,000 倍**と**サンミネーラ 10,000 倍**を散水する。 ※液肥施用時に混用でも良い。

害虫対策

近日点では害虫の発生が多いので、事前対応を日頃から心がける。
害虫対策に**バイオアクト TS 50~70 cc(又はスツパー-雅 100~200 cc) / 10a**を5~7日毎に灌水する。

追肥(液肥)

土壤環境、並びに年数、根の働きによっても増減する。

プロ液肥	0.5~1 ℓ / 10a	} 5~10 日ごとに灌水する場合 ※収穫量や土壤条件、天候によって加減する。
時を越えた贈り物	100~200 cc / 10a	
サンミネーラ	50 cc / 10a	
バイオアクト TS(又はスツパー-雅)	50cc(100cc) / 10a	

※サンミネーラの代わりにシリアップ 100~150 cc、天然ミネラル 100~200 cc、海藻のエキス 50g でもよい。

ご注文やお問い合わせは、

有限会社 丸 富 0942 - 65 - 0123 (TEL)

FAX 0942-65-1091 (24 時間受付) 携帯 090-3328-7603 (富松まで)