

アスパラガス栽培管理 (R5.3.)

(有) 丸 富

2月は比較的曇天が多く、日照不足傾向だったので、地温の上昇が遅く萌芽が遅れた。各地で収穫量が伸び悩んでいた。日中の気温が上昇すると共に、地温が上がると、収穫量が多くなった。

立茎前に

立茎前に、若茎の伸長を促進する土壌微生物の増になる資材や糖類、アミノ酸などを灌水する。

立茎前に**天地の恵み 1ℓ(又はバイオシャイングリーン 3ℓ) / 10a** と **天然ミネラル 200 cc / 10a** と **サンミネーラ 50 cc / 10a** を灌水(灌注)する。

伸長促進

若茎の伸長を促進し、春芽を早く収穫して回転率を上げ、収穫量を伸ばす。

若茎の伸長促進に**笑顔 1,000 倍(又は天地の恵み 500 倍)**と**サンミネーラ 10,000 倍**を葉面散布する。

害虫対策

近日点では害虫の発生が多いので、ハウス周辺環境に注意して、事前対応を日頃から心がける。

害虫対策に**バイオアクト TS 50~70 cc(又はスツパー-雅 100~200 cc) / 10a**を5~7日毎に灌水する。

発根促進

地温が上がると、土壌中の溶存酸素濃度が低下するので、根の働きに必要な酸素を供給する。

発根促進に**天地の恵み(又は発根力) 500 cc / 10a** と **G バランス DF 500g / 10a** を灌水(灌注)する。

病害対策

立茎後、ハウス内が蒸れると、病害の発生が多くなる。できる限り茎葉が混み合わないよう管理する。

病害抵抗性の強化に**酸カル 1,000 倍**と**時を越えた贈り物 2,000 倍**と**サンミネーラ 10,000 倍**を散布する。

※防除時に混用でも良い。

追肥(液肥)

土壌環境、並びに年数、根の働きによっても増減する。

プロ液肥 0.5~1 ℓ / 10a

時を越えた贈り物 100~200 cc / 10a

サンミネーラ 50 cc / 10a

バイオアクト TS(又はスツパー-雅) 50cc(100cc) / 10a

5~10 日ごとに灌水する場合

※収穫量や土壌条件、天候によって加減する。

※サンミネーラの代わりにシカアップ 100~150 cc、天然ミネラル 100~200 cc、海藻のエキス 50g でもよい。

ご注文やお問い合わせは、

有限会社 丸 富 0942 - 65 - 0123 (TEL)

FAX 0942-65-1091 (24 時間受付) 携帯 090-3328-7603 (富松まで)