

アスパラガス栽培管理 (R5.4.)

(有) 丸 富

3月は三寒四温で徐々に暖かくなったが、寒暖差が激しかった。気温が上がり、収穫量は増えたものの、細い若茎が多く、収穫は気温や天気に大きく影響された。スリップスなど害虫の発生が早かった。

伸長促進

光合成を促進して若茎の伸長を促し、早く収穫して回転率を上げ、収穫量を伸ばす。

立茎前に**笑顔 1,000 倍(又は天地の恵み 500 倍)**と**サンミネーラ 10,000 倍**を葉面散布する。

曲がり、偏平対策に**酸カル 100~200 cc/10a**と**天然ミネラル 100~200 cc/10a**を灌水する。

ピンチ前に

ピンチする前に茎葉を緑化促進して充実させ、生産性の向上を図ると共に、病害抵抗性を強化する。

ピンチ前に**酸カル 1,000 倍**と**天然ミネラル 2,000 倍**と**サンミネーラ 10,000 倍**を散布する。(防除時でも可)

害虫対策

近日点の満月頃は特に害虫の発生が多いので、事前対応を日頃から心がける。

害虫対策に**バイオアクト TS 50~70 cc(又はスツパー-雅 100~200 cc)/10a**を5~7日毎に灌水する。

病害対策

曇天で高温多湿が続くと、蒸れて病害の発生が多くなる。できる限り通気性が良い茎葉を維持する。

病害抵抗性の強化に**酸カル 1,000 倍**と**時を越えた贈り物 2,000 倍**と**サンミネーラ 10,000 倍**を散布する。

※防除時に混用しても良い。

発根促進

地温が上がると、土壌中の溶存酸素濃度が低下するので、根の働きに必要な酸素を供給する。

発根促進に**天地の恵み(又は発根力)500 cc/10a**と**G バランス DF 500g/10a**を1ヶ月に2回、灌水(灌注)する。

追肥(液肥)

土壌環境、並びに年数、根の働きによっても増減する。

プロ液肥 3~5 ℓ /10a

時を越えた贈り物 100~200 cc/10a

サンミネーラ 50 cc/10a

バイオアクト TS(又はスツパー-雅) 50cc(100cc)/10a

5~10 日ごとに灌水する場合

※収穫量や土壌条件、天候によって
加減する。

※サンミネーラの代わりにシカアップ 100~150 cc、天然ミネラル 100~200 cc、海藻のエキス 50g でもよい。

ご注文やお問い合わせは、

有限会社 丸 富 0942 - 65 - 0123 (TEL)

FAX 0942-65-1091 (24 時間受付) 携帯 090-3328-7603 (富松まで)