

アスパラガス栽培管理(R5.5.)

(有) 丸 富

4月 は日中が暑くなったが、朝晩は冷えて寒暖差が激しかった。収穫量は気温に左右され、変動が大きかった。近日点で害虫が多く、スリップス、アブラムシなどの被害が多くなった。

害虫対策

近日点の満月頃は害虫の発生が多いので、事前対応を日頃から心がける。ハウス周辺の環境の変化に注意する。

害虫対策に**バイオアクト TS 50～100 cc(ストッパー雅 100～200 cc)／10a**を5～7日毎に灌水する。

ピンチ前に

ピンチ前に茎葉を緑化促進して充実させ、生産性の向上を図ると共に、病害抵抗性を強化する。

ピンチ前に**酸カル 1,000 倍**と**天然ミネラル 2,000 倍**と**サンミネーラ 10,000 倍**を散布する。(防除時でも可)

発根促進

土壌中の溶存酸素濃度が低下すると、根の働きが低下するので、必要な酸素を供給する。

発根促進に**天地の恵み 250 cc(又は発根力 500 cc)／10a**と**G バランス DF 500g／10a**を1ヶ月に2回、灌水する。

伸長促進

茎葉で光合成した養分が若茎に転流して伸長する。光合成を促進し、転流効率を高めて、早く収穫して収穫量を伸ばす。

ピンチ後、樹勢回復に**笑顔 1,000 倍(又は天地の恵み 500 倍)**と**サンミネーラ 10,000 倍**を葉面散布する。

曲がり、偏平対策に**酸カル 100～200 cc／10a**と**天然ミネラル 100～200 cc／10a**を灌水する。

病害対策

曇天で高温多湿が続くと、蒸れて病害の発生が多くなる。できる限り通気性が良い茎葉を維持する。

病害抵抗性の強化に**酸カル 1,000 倍**と**時を越えた贈り物 2,000 倍**と**サンミネーラ 10,000 倍**を散布する。

※防除時に混用しても良い。

追肥(液肥)

土壌環境、並びに年数、根の働きによっても増減する。

プロ液肥 3～5 ℓ／10a

時を越えた贈り物 100～200 cc／10a

サンミネーラ 50 cc／10a

バイオアクト TS(又はストッパー雅) 50cc(100cc)／10a

5～10 日ごとに灌水する場合

※収穫量や土壌条件、天候によって加減する。

※サンミネーラの代わりにシリアップ 100～150 cc、天然ミネラル 100～200 cc、海藻のエキス 50g でもよい。

ご注文やお問い合わせは、

有限会社 丸 富 0942 - 65 - 0123 (TEL)

FAX 0942-65-1091 (24 時間受付) 携帯 090-3328-7603 (富松まで)