

アスパラガス栽培管理(R5.6.)

(有)丸富

5月は日中が夏のよう暑くなつたが、朝晩は冷えて寒暖差が激しかつた。カビ、スリップスなど病害虫の発生が多かつた。気温によって出荷量が大きく変動した。夏芽が出るまで収穫量が少ない状態だつた。

ピンチ前に

茎葉を緑化し、充実させて生産性の向上を図ると共に、病害抵抗性を強化する。

緑化に**酸カル 1,000 倍**と**天然ミネラル 2,000 倍**と**サンミネーラ 10,000 倍**を散布する。(防除時でも可)

発根促進

温度が上がると、土壤中の溶存酸素濃度が低下するので、根の働きが低下する。根の働きに必要な酸素を供給する。

発根促進に**天地の恵み 250 cc(又は発根力 500 cc)／10a**と**G バランス DF 500g／10a**を1ヶ月に2回、灌水する。

伸長促進

茎葉で光合成した養分が若茎に転流して伸長する。光合成を促進し、転流効率を高めて、早く収穫して収穫量を伸ばす。

ピンチ後、樹勢回復に**笑顔 1,000 倍(又は天地の恵み 500 倍)**と**サンミネーラ 10,000 倍**を葉面散布する。曲がり、偏平対策に**酸カル 100～200 cc／10a**と**天然ミネラル 100～200 cc／10a**を灌水する。

害虫対策

満月頃は害虫の発生が多いので、事前対応を日頃から心がける。ハウス周辺の環境の変化に注意する。

害虫対策に**バイオアクト TS 50～100 cc(ストッパー雅 100～200 cc)／10a**を5～7日毎に灌水する。

病害対策

曇天で高温多湿が続くと、蒸れて病害の発生が多くなる。できる限り通気性が良い茎葉を維持する。

病害抵抗性の強化に**酸カル 1,000 倍**と**時を越えた贈り物 2,000 倍**と**サンミネーラ 10,000 倍**を散布する。

※防除時に混用しても良い。

追肥(液肥)

土壤環境、並びに年数、根の働きによっても増減する。

プロ液肥	5～7ℓ／10a	}
時を越えた贈り物	100～200 cc／10a	
サンミネーラ	50 cc／10a	
バイオアクト TS(又はストッパー雅)	50cc(100cc)／10a	

5～10 日ごとに灌水する場合

※収穫量や土壤条件、天候によって
加減する。

※サンミネーラの代わりにシリカアップ 100～150 cc、天然ミネラル 100～200 cc、海藻のエキス 50g でもよい。

ご注文やお問い合わせは、

有限会社 丸富 0942-65-0123 (TEL)

FAX 0942-65-1091 (24 時間受付) 携帯 090-3328-7603 (富松まで)