

野菜(トマト・ナス)栽培管理 (R5.5.)

(有) 丸 富

4 月は日中が暑くなったが、朝晩は冷えて寒暖差が激しかった。曇天で温かく湿気が多い日が続いたら、葉かじ、灰色かじなど病害の発生が多かった。また、気温が上がって麦が熟れると、スリップスなどの被害が多かった。

害虫対策

近日点ではハウス周辺のスリップス、アブラムシ、ダニなどが多くなって、ハウス内に侵入するので、事前に回避する。
害虫対策に**バイオアクト TS 50～100 cc／10a**を 5～7 日毎に灌水する。

発根促進

土壌中の溶存酸素濃度が下がると、根の働きが低下するので、根に必要な酸素を供給する。
発根促進に**笑顔 1000 倍(又は天地の恵み 500 倍)**と**サンミネーラ 10,000 倍**を葉面散布する。
灌水時に**G バランス DF 0.5 kg／10a**と**天地の恵み 250 cc／10a**を 1 ヶ月に 2 回、施用する。

病害対策

高温多湿になると、灰色かじ病、葉かじ病など病害の発生が多くなる。ハウス内の通気性を良くし、換気扇や送風機を活用して、病害の発生を抑制する。
病害対策に**時を越えた贈り物 1,000 倍**と**酸カル 2,000 倍**と**サンミネーラ 10,000 倍**を葉面散布する。

品質向上

収穫期間が長くなると、徐々に根の働きが低下し、吸収根が減少する。吸収根の減少は微量要素の吸収低下につながる。
裂果(皮)対策や品質向上に**酸カル 1,000 倍**と**天然ミネラル 2,000 倍**と**サンミネーラ 5,000 倍**を葉面散布する。

軟果対策

高温多湿で曇天が続くと、蒸散が妨げられ、光合成が低下し、作物の品質が低下する。
軟果抑制に**酸カル 1,000 倍**と**時を越えた贈り物 1,000 倍**と**サンミネーラ 5,000 倍**を葉面散布する。
灌水時に**酸カル 100 cc／10a**と**時を越えた贈り物 100 cc／10a**と**サンミネーラ 50 cc／10a**を施用する。

追肥(液肥)

土質や生育状況、環境、肥培管理によって増減する。

時を越えた贈り物(又は天地の恵み)	100～200 cc／10a	} 5～7 日毎に灌水する場合 ※生育状況によって加減する。
サンミネーラ	50～70 cc／10a	
酸カル(又は天然ミネラル)	100～200 cc／10a	
バイオアクト TS	50～70 cc／10a	

※サンミネーラの代わりに、シカアップ 100～150 cc、天然ミネラル 150～200 cc、海藻のエキス 50g でもよい。

ご注文やお問い合わせは、**有限会社 丸 富** TEL (0942) 65-0123

FAX0942-65-1091 (24 時間受付) 携帯 090-3328-7603 (富松まで)