

野菜(トマト・ナス)栽培管理 (R5.6.) (有) 丸 富

5 月は日中が夏のように暑くなったが、朝晩は冷えて寒暖差が激しかった。曇天が続くと灰色かび病など病害の発生が多かった。麦や玉ねぎが収穫されると、スリップスなど害虫が移動するので、被害が多かった。

軟果対策

高温多湿で曇天が続くと、蒸散が妨げられ、光合成が低下すると、作物の品質が低下する。

軟果抑制に**酸カル 1,000 倍**と**時を越えた贈り物 1,000 倍**と**サンミネーラ 5,000 倍**を葉面散布する。

灌水時に**酸カル 100 cc/10a**と**時を越えた贈り物 100 cc/10a**と**サンミネーラ 50 cc/10a**を施用する。

品質向上

収穫期間が長くなると、徐々に根の働きが低下し、吸収根が減少する。吸収根を活発にさせると、微量要素の吸収が向上し、品質の向上につながる。

裂果(皮)対策や品質向上に**酸カル 1,000 倍**と**天然ミネラル 2,000 倍**と**サンミネーラ 5,000 倍**を葉面散布する。

発根促進

土壌中の溶存酸素濃度が下がると、根の働きが低下するので、根に必要な酸素を供給する。

発根促進に**時を越えた贈り物 1000 倍**と**オリゴファイト 2,000 倍**と**サンミネーラ 10,000 倍**を葉面散布する。

灌水時に**G バランス DF 0.5 kg/10a**と**天地の恵み 250 cc/10a**を1ヶ月に2回、施用する。

害虫対策

満月頃はハウス周辺のスリップス、アブラムシ、ダニなどが活発に活動してハウス内に侵入するので、事前に回避する。

害虫対策に**バイオアクト TS 50~100 cc/10a**を5~7日毎に灌水する。

病害対策

高温多湿になると、灰色かび病、葉かび病など病害の発生が多くなる。ハウス内の通気性を良くし、循環扇や送風機を活用して、病害の発生を抑制する。

病害対策に**時を越えた贈り物 1,000 倍**と**酸カル 2,000 倍**と**サンミネーラ 10,000 倍**を葉面散布する。

追肥(液肥)

土質や生育状況、環境、肥培管理によって増減する。

時を越えた贈り物(又は天地の恵み) 100~200 cc/10a

サンミネーラ 50~70 cc/10a

酸カル(又は天然ミネラル) 100~200 cc/10a

バイオアクト TS 50~70 cc/10a

5~7 日毎に灌水する場合

※生育状況によって加減する。

※サンミネーラの代わりに、シカアップ 100~150 cc、天然ミネラル 150~200 cc、海藻のエキスを50gでもよい。

ご注文やお問い合わせは、

有限会社 丸 富

TEL (0942) 65-0123

FAX0942-65-1091 (24 時間受付)

携帯 090-3328-7603 (富松まで)