

アスパラガス栽培管理 (R5.7.)

(有) 丸 富

6 月前半は梅雨入りしたものの、あまり雨が降らなかったが、後半になって雨が降ってきた。高温多湿になって収穫量が増えた。病害虫は少なかったが、遠日点で高温多湿になれば、病害の発生が多くなる。

発根促進

気温が上がると、地温も同様に徐々に上昇する。地温が上昇すると、土壌中の溶存酸素濃度が低下するので、根の働きが低下する。根の働きに必要な酸素を供給する。

発根促進に**天地の恵み(時を越えた贈り物)250 cc/10a**と**G バランス DF 500g/10a**を1ヶ月に2回、灌水する。

緑化促進

茎葉を緑化し、充実させて光合成の向上を図ると共に、病害抵抗性を強化する。

緑化に**天然ミネラル 1,000 倍**と**酸カル 2,000 倍**と**サンミネーラ 10,000 倍**を散布する。(防除時でも可)

伸長促進

高温障害対策として、出来る限り茎葉の上に風を通す。高温になると、光合成能力の低下や光合成した養分の消耗が生じる。光合成を促進し、転流効率を高めて、早く収穫して収穫量を伸ばす。

光合成促進に**時を越えた贈り物 1,000 倍**と**酸カル 2,000 倍**と**サンミネーラ 10,000 倍**を葉面散布する。曲がり、偏平対策に**酸カル 100~200 cc/10a**と**天然ミネラル 100~200 cc/10a**を灌水する。

害虫対策

満月頃は害虫の発生が多いので、事前対応を日頃から心がける。ハウス周辺の環境の変化に注意する。

害虫対策に**バイオアクト TS 50~100 cc(ストップ-雅 100~200 cc)/10a**を5~7日毎に灌水する。

病害対策

梅雨で曇雨天が続くと、蒸れて病害の発生が多くなる。できる限り通気性が良い茎葉を維持する。

病害抵抗性の強化に**酸カル 1,000 倍**と**時を越えた贈り物 2,000 倍**と**サンミネーラ 10,000 倍**を散布する。

※防除時に混用しても良い。

追肥(液肥)

土壌環境、並びに年数、根の働きによっても増減する。

プロ液肥 5~7ℓ/10a

時を越えた贈り物 100~200 cc/10a

サンミネーラ 50 cc/10a

バイオアクト TS(又はストップ-雅) 50cc(100cc)/10a

5~10 日ごとに灌水する場合

※収穫量や土壌条件、天候によって加減する。

※サンミネーラの代わりにシリアップ 100~150 cc、天然ミネラル 100~200 cc、海藻のエキス 50g でもよい。

ご注文やお問い合わせは、

有限会社 丸 富 0942 - 65 - 0123 (TEL)

FAX 0942-65-1091 (24 時間受付) 携帯 090-3328-7603 (富松まで)