

アスパラガス栽培管理 (R5.10.)

(有) 丸 富

9月は彼岸頃まで記録的な猛暑で干ばつ傾向だったが、時折線状降水帯が出来て、各地で大雨が発生した。収穫は暑すぎて二度切りするところが少なかった。酷暑が続いて病害虫の発生が少なかった。

台風対策

高温が続くと台風の勢力が衰えないため、接近、又は上陸に注意する。まだしばらく暑いので、線状降水帯や豪雨にも注意が必要。

台風が通過した後、防除時に**笑顔 1,000倍**と**サンミネーラ 10,000倍**を混用散布する。

貯蔵養分蓄積

若茎の収穫と同時に来年の春芽の形成に大事な貯蔵養分を蓄積する。適宜、茎葉の管理を行い、光合成を促進する。

養分蓄積に**時を越えた贈り物 1,000倍**と**サンミネーラ 5,000倍**を葉面散布、又は防除時に混用する。

品質向上

日照不足(過繁茂による光合成の低下)が品質の低下をもたらす。日頃の手入れが大切。

品質向上に**天然ミネラル 2,000倍**と**酸カル 2,000倍**と**サンミネーラ 10,000倍**を散布する。(防除時も可)
曲がり、扁平対策に**酸カル 50~100 cc/10a**と**天然ミネラル 50~100 cc/10a**を灌水する。

病害対策

通気性が良い茎葉で管理し光合成を維持する。

病害抵抗力強化に**酸カル 1,000倍**と**時を越えた贈り物 2,000倍**と**サンミネーラ 10,000倍**を散布する。
※防除時に混用しても良い。

害虫対策

近日点で満月頃はとくに害虫の発生が多くなるので、事前対応を日頃から心がける。

害虫対策に**バイオアクト TS 50~70 cc(ストップ-雅 100~200 cc)/10a**を5~7日毎に灌水する。

追肥(液肥)

土壌環境、並びに年数、根の働きによっても増減する。

プロ液肥	1~3ℓ/10a	} 5~10日ごとに灌水する場合 ※収穫量や土壌条件、天候によって 加減する。
時を越えた贈り物	100~200 cc/10a	
サンミネーラ	50 cc/10a	
バイオアクト TS(又はストップ-雅)	50cc(100cc)/10a	

※サンミネーラの代わりにシリアップ 100~150 cc、天然ミネラル 100~200 cc、海藻のエキス 50gでもよい。

ご注文やお問い合わせは、

有限会社 丸 富 0942 - 65 - 0123 (TEL)

FAX 0942-65-1091 (24時間受付) 携帯 090-3328-7603 (富松まで)