

# アスパラガス栽培管理(R6.3.)

(有)丸 富

2月前半は比較的穏やかで、暖かい日が多く地温が上がった。後半は曇天が多く、日照不足で地温が上がらなかった。アスパラガスは天気(地温)によって、萌芽や収穫量が大きく影響するので、天気がとても大事。

## 伸長促進

若茎を収穫すると、次の若茎が伸びる。若茎を次々に早く伸ばして、収穫量を増やす。

若茎の伸長促進に**笑顔 1,000 倍**と**サンミネーラ 10,000 倍**を若茎に直接散布する。2~3日毎に散布。灌水、又は散水する場合は**時を越えた贈り物(又は、天地の恵み) 200~300 cc/10a**と**サンミネーラ 50 cc/10a**を施用する。

## 品質の向上

収穫量が増えれば、それに応じて土から多くの養分を吸収する。三大要素だけではなく、沢山の微量元素を吸収している。そのため、日頃から数多くの微量元素を少しずつ施す必要がある。

品質向上に**酸カル 50~100 cc/10a**と**サンミネーラ 50 cc/10a**を灌水時、混用する。(5~10日毎に)

## 立茎前

立茎をスムーズに行うためには、樹勢を強く維持することが大切。立茎前に、追肥(液肥)を行い、樹勢回復、又は樹勢維持を行う。

作物の樹勢回復に**天地の恵み 0.5~1ℓ/10a**と**サンミネーラ 50 cc/10a**を立茎直前に灌水時する。以後、立茎中は5日毎に**天地の恵み 0.5~1ℓ/10a**と**サンミネーラ 50 cc/10a**を灌水する。

## 病害対策

遠日点では病害の発生が多くなるので、出来る限り、窒素過多にならないよう肥培管理を行う。菜種梅雨や前線を伴った低気圧により、病害の発生が多くなるので、天気予報にも注意して、観察を行う。

窒素消化促進と病害抵抗力強化に**時を越えた贈り物 1,000 倍**と**酸カル 1,000 倍**と**サンミネーラ 5,000 倍**を散布する。(防除時混用でも良い。)

## 追肥(液肥)

土壤環境、並びに年数、根の働きによっても増減する。

プロ液肥	2~5ℓ/10a
時を越えた贈り物	100~200 cc/10a
サンミネーラ	50 cc/10a
バイオアクト TS(又はストップ-雅)	50cc(100cc)/10a

5~10日ごとに灌水する場合  
※収穫量や土壤条件、天候によって  
加減する。

※サンミネーラの代わりにシカアップ 100~150 cc、天然ミネラル 100~200 cc、海藻のエキス 50gでもよい。

ご注文やお問い合わせは、

有限会社 丸 富 0942 - 65 - 0123 (TEL)

FAX 0942-65-1091 (24 時間受付) 携帯 090-3328-7603 (富松まで)