

アスパラガス栽培管理 (R6.4.)

(有) 丸 富

3月は比較的曇天が多く、雨や雷が多かった。細い若茎が多く、各地で収穫量がかなり減少した。過去に経験がない程減少したのは、いろんな原因が絡み合った結果で、改めて原点から見直しが必要だと感じた。

ピンチ前

立茎後、展開(葉)がスムーズ出来たら、ピンチにより一時的に樹勢が落ちる前に維持することが大切。
樹勢維持を事前に**天地の恵み 0.5~1ℓ / 10a**と**サンミネーラ 50 cc / 10a**をピンチ前に灌水時する。

品質の向上

曲がりや偏平が増えれば、収穫ロス(無駄)になるから、日頃から数多くの微量元素を少しずつ施し、品質の向上を図る。

品質向上に**酸カル 50~100 cc / 10a**と**サンミネーラ 50 cc / 10a**を灌水時、混用する。(5~10日毎に)

伸長促進

春芽は若茎を早く伸ばし採ると、次の若茎が早く伸びる。若茎を次々に伸ばして、収穫量を増やす。

若茎の伸長促進に**笑顔 1,000倍**と**サンミネーラ 10,000倍**を若茎に直接散布する。2~3日毎に散布。

立茎前

立茎をスムーズに行うためには、樹勢を強く維持する。立茎前に、追肥(液肥)を行い、樹勢維持を行う。

作物の樹勢回復に**天地の恵み 0.5~1ℓ / 10a**と**サンミネーラ 50 cc / 10a**を立茎直前に灌水時する。

以後、立茎中は5日毎に**天地の恵み 0.5~1ℓ / 10a**と**サンミネーラ 50 cc / 10a**を灌水する。

病害対策

遠日点では窒素過多で病害の発生が多くなるので、肥培管理に気をつける。前線を伴った低気圧が通過すると、病害の発生が多くなるので、天気予報にも注意して、観察を行う。

窒素消化促進と病害抵抗力強化に**時を越えた贈り物 1,000倍**と**酸カル 1,000倍**と**サンミネーラ 5,000倍**を散布する。(防除時混用でも良い。)

追肥(液肥)

土壌環境、並びに年数、根の働きによっても増減する。

プロ液肥 2~5ℓ / 10a

時を越えた贈り物 100~200 cc / 10a

サンミネーラ 50 cc / 10a

バイオア外 TS(又はストップ-雅) 50cc(100cc) / 10a

5~10日ごとに灌水する場合

※収穫量や土壌条件、天候によって加減する。

※サンミネーラの代わりにシカアップ 100~150 cc、天然ミネラル 100~200 cc、海藻のエキス 50gでもよい。

ご注文やお問い合わせは、

有限会社 丸 富 0942 - 65 - 0123 (TEL)

FAX 0942-65-1091 (24時間受付) 携帯 090-3328-7603 (富松まで)