

アスパラガス栽培管理(R6.5.)

(有)丸 富

4月は比較的曇天や大雨が多く、天気が回復すると、真夏のような高温に。タニやスリップス、加びなど病害虫が各地で多く発生した。日照不足により、細い若茎が多く、各地で収穫量がかなり減少した。

病害対策

窒素過多で病害の発生が多くなるので、肥培管理に気をつける。前線を伴った低気圧が通過した時や湿度が高い状態が続いた時に病害の発生が多くなるので、注意して観察を行う。

窒素消化促進と病害抵抗力強化に**時を越えた贈り物 1,000倍**と**酸カル 1,000倍**と**サンミネーラ 5,000倍**を散布する。(防除時混用でも良い。)

品質の向上

曲がりや偏平などが増えると、秀品率が下がるので、日頃から数多くの微量元素を少しずつ施し、品質の向上を図る。

品質向上に**酸カル 50~100 cc/10a**と**サンミネーラ 50 cc/10a**を灌水時、混用する。(5~10日毎に)

ピンチ前

先端まで展開(葉)したら、ピンチする。一時的に樹勢が落ちるのを考慮して、事前に樹勢維持する。

樹勢維持に**天地の恵み 0.5~1ℓ/10a**と**サンミネーラ 50 cc/10a**をピンチ前に灌水時する。

伸長促進

夏芽が出始めたら、若茎を早く伸ばし採ると、次の若茎が早く伸びる。若茎を継続して伸ばすと、収穫量が増える。

若茎の伸長促進に**笑顔 1,000倍**と**サンミネーラ 10,000倍**を若茎に直接散布する。2~3日毎に散布。

害虫対策

高温になると、害虫の発生が多くなるので、早め(事前)の対策が大切。

事前対応に**バイオアクト TS 50~70 cc/10a(又は、ストップ-雅 100~200 cc/10a)**を3~5日毎に灌水する。

追肥(液肥)

土壤環境、並びに年数、根の働きによっても増減する。

プロ液肥 3~7ℓ/10a

時を越えた贈り物 100~200 cc/10a

サンミネーラ 50 cc/10a

バイオアクト TS(又はストップ-雅) 50cc(100cc)/10a

5~10日ごとに灌水する場合

※収穫量や土壤条件、天候によって加減する。

※サンミネーラの代わりにシリアップ 100~150 cc、天然ミネラル 100~200 cc、海藻のエキス 50gでもよい。

ご注文やお問い合わせは、

有限会社 丸 富 0942 - 65 - 0123 (TEL)

FAX 0942-65-1091 (24時間受付) 携帯 090-3328-7603 (富松まで)