

# いちご栽培管理 (R6.5.)

(有) 丸 富

4月は比較的曇天や大雨が多く、天気が回復すると、真夏のような高温に。ダニやスリップス、灰色かび、ウドンコ病など病害虫が各地で多く発生した。日照不足により、糖度が低く、不受精果も多く、例年より品質が悪かった。

## 品質の向上

日長時間が長く、気温が上がり、遠日点の新月頃はとくに栄養生長になるので、花粉が弱くなる。  
新月前から新月後にかけて**オリゴファイト 2,000倍**と**サンミネーラ 2,000倍**を2、3回葉面散布する。

## 肥大促進

日照不足では根の働きが悪いので、光合成を促進して、果実の肥大を促す。  
肥大促進に**K-40 250g/10a**と**酸カル 50 cc/10a**と**サンミネーラ 50 cc/10a**を灌水する。

## 親苗のランナー発生

ランナーの発生が盛んになるように、栄養生長を促進して、ランナーの発生を促進する。  
ランナーの発生促進に**笑顔 1,000倍**(又は、**天地の恵み 500倍**)と**サンミネーラ 10,000倍**を葉面散布、又は、防除時混用、灌注散水する。

## 病害対策

新月過ぎは栄養生長傾向になるので、ウドンコ病やかび病など病害の発生に注意する。  
病害抵抗性の向上と細胞壁強化に**酸カル 2,000~3,000倍**と**サンミネーラ 10,000倍**を防除時に混用する。

## 害虫対策

高温になるとダニ、スリップスの繁殖が盛んになるので注意する。気温が上がると、ハウス周辺や苗床のスリップスやダニが発生し、周りから侵入するので、注意する。  
周辺から侵入する害虫対策に**バイオアクトTS 50~100 cc/10a**を散水灌水し、害虫対策を行う。  
害虫の繁殖抑制に**バイオアクトTS 2,000~3,000倍**を防除時に混用する。

## 追肥(液肥)

施用量は肥料、土質、樹勢、環境などによって加減する。

プロ液肥	0.5~1ℓ/10a
時を越えた贈り物(又は天地の恵み)	100~200cc/10a
サンミネーラ	50~100cc/10a
バイオアクトTS	50~70cc/10a

5~7日毎に灌水する場合  
※状況に応じて加減する

※サンミネーラの代わりに

シカアップ 100~150 cc、天然ミネラル 200~300 cc、海藻のエキス 50~100 g でもよい。

ご注文やお問い合わせは、

有限会社 丸 富 TEL (0942) 65-0123

FAX 0942-65-1091 (24時間受付)

携帯 090-3328-7603 (富松まで)