

# アスパラガス栽培管理(R7.6.)

(有) 丸 富

5月は天気が激変し、寒暖差が大きく、管理し難い天候でした。夜温が下がったため、夜間の伸長が悪く、収穫量が伸び悩んだ。一部で害虫被害があったが、大きな影響はなかった。全般的に春芽は不作だった。

## ピンチ前

茎葉が展開したら、生長点をピンチして、通気性を良くし、光合成を促進する。

茎葉の展開促進に**時を越えた贈り物 1,000倍**と**サンミネーラ 5,000倍**を散布する。(防除時に混用可)

## 発根促進

遠日点では根の働きが悪いので、吸収根(細根)の働きを活発に維持する。

発根促進に**グリンスター(発根力)500 cc/10a**と**GバランスDF 1 kg/10a**を30~45日ごとに灌水する。

## 品質向上

土壌養分のバランスを考慮して、追肥(液肥)を施す。遠日点では窒素過多に注意する。

品質向上に**時を越えた贈り物 200 cc/10a**と**酸カル 100 cc/10a**と**サンミネーラ 50 cc/10a**を液肥に混用して灌水する。

土壌養分が偏らないように**農業用植物マグマ黒末 1~3 kg/10a**を土壌撒布する。

## 夏芽促進

親茎の緑化を促し、光合成を促進する。二次葉、ぎ葉の発生を促しつつ、過分な伸長を抑制する。

親茎の緑化促進に**時を越えた贈り物 1,000倍**と**酸カル 2,000倍**と**サンミネーラ 5,000倍**を葉面散布する。

## 害虫対策

周辺の作物(麦、玉葱)の防除や収穫により、害虫の飛び込みが多くなる。ハウス周辺の環境変化(除草、防除)に気をつける。

害虫対策に**バイオアクト TS 50~100 cc/10a(又は、ストップ-雅 200~300 cc/10a)**を5~7日毎に灌水する。

その後、防除時に**バイオアクト TS 2000~3000倍(又は、ストップ-雅 500~1,000倍)**を混用する。

## 追肥(液肥)

土壌環境、並びに年数、根の働きによっても増減する。

**プロ液肥** 5~10ℓ/10a

**時を越えた贈り物** 100~200 cc/10a

**サンミネーラ** 50 cc/10a

**バイオアクト TS(又はストップ-雅)** 50cc(100cc)/10a

5~10日ごとに灌水する場合

※収穫量や土壌条件、天候によって加減する。

※サンミネーラの代わりにシリアップ 100~150 cc、シーマックス 500~1000 cc、海藻のエキス 50gでもよい。

ご注文やお問い合わせは、

有限会社 丸 富 0942-65-0123 (TEL)

**FAX 0942-65-1091 (24時間受付)** 携帯 090-3328-7603 (富松まで)