

いちご栽培管理 (R7.5.)

(有) 丸 富

4月は日中が夏のように暑くなったり、朝晩が冬のように寒かったり天気が激変した。近日点でアザミウマ、アブラムシ、ダニなど害虫の発生が多かった。暑くなって品質が低下し価格が下がった。中休みして早く止めた所が多かった。

過熟・軟果対策

高温になると、過熟や軟果が増え、品質が低下する。できる限り冷やして、過熟防止に努め、事前の肥培管理で果実の軟果を抑える。

果実の軟果抑制に**酸カル 1,000 倍**と**時を越えた贈り物 2,000 倍**と**サンミネーラ 5,000 倍**を散布する。

灌水で**酸カル 200 cc/10a**と**時を越えた贈り物 100 cc/10a**と**サンミネーラ 50 cc/10a**を液肥混用する。

害虫対策

暑くなると害虫の発生が盛んになるので、注意して観察を行う。害虫対策として防除前に**バイオアクトTS 50~100 cc/10a**を灌水する。ハウス周辺の環境変化(除草、草刈り、防除)にも注意する。

害虫の繁殖抑制に**バイオアクトTS 2,000~3,000 倍**を防除時に混用する。

ねみ、害虫の予防に**バイオアクトTS 50~100 cc/10a**を3~7日ごとに灌水する。

親苗管理

養分不足になると、花芽分化しやすいので、肥料切れしないように苗の管理を行う。

親苗の防除時に**天地の恵み 1,000~2,000 倍**と**サンミネーラ 10,000 倍**を混用散布する。

ランナーの発生促進

日長時間が長くなると、子孫を残すために、ランナーが発生する。

ランナーの発生促進に**笑顔 1,000 倍(天地の恵み 500 倍)**と**サンミネーラ 10,000 倍**を新月前後に散布する。

病害対策

苗半作！というように、苗の管理が大事。病虫害の管理を行い、できる限り罹病株は撤去する。

病害対策に**時を越えた贈り物 1,000 倍**と**酸カル 2,000 倍**と**サンミネーラ 10,000**を防除時に混用する。

追肥(液肥)

施用量は肥料、土質、樹勢、環境などによって加減する。

プロ液肥 0.5~1 kg/10a

時を越えた贈り物(又は、天地の恵み) 100~200 cc/10a

サンミネーラ 50~100 cc/10a

バイオアクトTS 70~100 cc/10a

5~7 日毎に灌注、散水する場合

※状況に応じて加減する

※サンミネーラの代わりに

シリアップ 100~200 cc、天然ミネラル 200~300 cc、海藻のエキス 50~100 g でもよい。

ご注文やお問い合わせは、

有限会社 丸 富

TEL (0942) 65-0123

FAX 0942-65-1091 (24 時間受付)

携帯 090-3328-7603 (富松まで)