

野菜(トマト・ナス)栽培管理 (R7.5.) (有) 丸 富

4月は日中が夏のように暑くなったり、朝晩が冬のように寒かったり天気が激変した。また、突風や竜巻、雹など大荒れしてハウスに被害があった。近日点でコナジラミ、アザミウマ、ダニなど害虫の発生が多かった。

品質向上(成り疲れ対策)

着果負担が増大すると、果実の肥大に使う養分が増え、着花不良になる。
なり疲れ対策に**笑顔 1,000 倍(天地の恵み 500 倍)**と**サンミネーラ 10,000 倍**を葉面散布する。
品質向上に**酸カル 100~200 cc/10a**と**サンミネーラ 50~100 cc/10a**を灌水する。(液肥に混用可)

根張り促進

地温が高くなると土壤中の溶存酸素量が低下するので、酸素供給を行い、細根の働きを維持する。
根張り促進に**G バランス DF 1 kg/10a**と**グリンスター 0.5 ㍓(発根力 1 ㍓)/10a**を1ヶ月毎に灌水する。

軟弱徒長対策

生長が早くなり過繁茂になると、軟弱徒長する。充実した株を作るよう事前に対応する。
株の充実に**酸カル 1,000 倍**と**時を越えた贈り物 2,000 倍**と**サンミネーラ 10,000 倍**を散布する。
灌水時に**酸カル 200 cc/10a**と**時を越えた贈り物 100 cc/10a**と**サンミネーラ 50 cc/10a**を混用する。

病害対策

成り疲れすると、根の働きが低下する。微量元素などの養分吸収が低下すると、窒素過多になるので、病害の発生が多くなる。窒素消化を促し、健全な株を育成すると、病害の発生が減少する。
窒素消化に**時を越えた贈り物 2,000 倍**と**酸カル 2,000 倍**と**サンミネーラ 5,000 倍**を散布する。

害虫対策

ハウスを開放すると、害虫の飛び込みが多くなる。できる限り害虫の侵入を事前に予防する。
害虫の事前対策に**バイオアクト TS 50~100 cc/10a**を5~7日毎に灌水する。

追肥(液肥)

土質や生育状況、環境、肥培管理によって増減する。

時を越えた贈り物(又は天地の恵み)	100~200 cc/10a	} 5~7 日毎に灌水する場合 ※生育状況によって加減する。
サンミネーラ	50~70 cc/10a	
酸カル(又は天然ミネラル)	50~100 cc/10a	
バイオアクト TS	50~70 cc/10a	

※サンミネーラの代わりに、シカアップ 100~150 cc、シマロックス 500~1000 cc、海藻のエキス 50g でもよい。

ご注文やお問い合わせは、 有限会社 丸 富 TEL (0942) 65-0123

FAX**0942-65-1091** (24 時間受付) 携帯 090-3328-7603 (富松まで)