

野菜(トマト・ナス)栽培管理 (R7.6.) (有) 丸 富

5 月は天気が激変し、寒暖差が大きく、管理し難い天候だった。朝晩の冷え込みで果実が大きく、近日点の影響で花芽分化や着果が良かった。病害虫の発生は一部であったものの、比較的穏やかに推移した。

病害対策

遠日点では栄養生長傾向になるので、根の働きが低下する。微量元素など養分吸収が低下すると、窒素過多になるので、病害の発生が多くなる。窒素消化を促し、健全な株を育成する。

窒素消化に**時を越えた贈り物 2,000 倍**と**酸カル 2,000 倍**と**サンミネーラ 5,000 倍**を散布する。

軟弱徒長対策

過繁茂になると、光を求めて徒長する。充実した株を作るよう事前に対応する。

株の充実に**酸カル 1,000 倍**と**時を越えた贈り物 2,000 倍**と**サンミネーラ 10,000 倍**を散布する。

灌水時に**酸カル 200 cc/10a**と**時を越えた贈り物 100 cc/10a**と**サンミネーラ 50 cc/10a**を混用する。

品質向上

収穫量が増大すると、収穫量に応じた養分が消費されるので、適切な肥培管理を行う。

曇天による日照不足対策に**笑顔 1,000 倍(天地の恵み 500 倍)**と**サンミネーラ 10,000 倍**を葉面散布する。

品質向上に**酸カル 100~200 cc/10a**と**サンミネーラ 50~100 cc/10a**を灌水する。(液肥に混用可)

根張り促進

根(土壌)に酸素供給を行い、土壌中の溶存酸素量を上げて、細根の働きを維持する。

根張り促進に**G バランス DF 1 kg/10a**と**グリンスター(発根力) 0.5 g/10a**を1ヶ月毎に灌水する。

害虫対策

ハウスを開放すると、害虫の飛び込みが多くなる。できる限り害虫の侵入を事前に予防する。

害虫の事前対策に**バイオアクト TS 50~100 cc/10a**を5~7日毎に灌水する。

追肥(液肥)

土質や生育状況、環境、肥培管理によって増減する。

時を越えた贈り物(又は天地の恵み) 100~200 cc/10a

サンミネーラ 50~70 cc/10a

酸カル(又は天然ミネラル) 50~100 cc/10a

バイオアクト TS 50~70 cc/10a

5~7 日毎に灌水する場合

※生育状況によって加減する。

※サンミネーラの代わりに、シカアップ 100~150 cc、シマロックス 500~1000 cc、海藻のエキス 50g でもよい。

ご注文やお問い合わせは、

有限会社 丸 富

TEL (0942) 65-0123

FAX 0942-65-1091 (24 時間受付)

携帯 090-3328-7603 (富松まで)