

アスパラガス栽培管理(R7.7.)

(有) 丸 富

6 月は梅雨入り後、曇天が多かったが、梅雨前線が消えたり、下旬には猛暑日になったり、激変した。遠日点では雑草の繁殖が盛んで、管理が大変だった。栄養生長傾向で夏芽の発生は比較的順調だった。

ピンチ後

生長点のピンチ(摘芯)後は通気性を良くし、光合成を促進する。側枝や二次側枝の発生を出来る限り抑制して、作業を軽減する。

側枝の抑制に**時を越えた贈り物 1,000 倍**と**酸カル 2,000 倍**と**サンミネーラ 5,000 倍**を防除時に混用する。

品質向上

遠日点では窒素過多に注意する。細根の働きが悪いので、窒素以外の吸収し難い養分は葉から施す。

品質向上に**時を越えた贈り物 200 cc/10a**と**酸カル 100 cc/10a**と**サンミネーラ 50 cc/10a**を液肥に混用して灌水する。土壌養分が偏らないように**農業用植物マグマ黒末 1~3 kg/10a**を土壌撒布する。

光合成促進に**時を越えた贈り物 1,000 倍**と**酸カル 2,000 倍**と**サンミネーラ 10,000 倍**を防除時に混用する。

発根促進

遠日点では細根の働きが悪く養分吸収が悪いため、吸収根(細根)の働きを活発に維持する。

発根促進に**グリンスター(発根力)500 cc/10a**と**Gバランス DF 1 kg/10a**を30~45日ごとに灌水する。

緑化促進

茎葉の緑化を促し、光合成を促進する。二次葉、ぎ葉の発生を抑制する。

緑化促進に**時を越えた贈り物 1,000 倍**と**酸カル 2,000 倍**と**サンミネーラ 5,000 倍**を葉面散布する。

害虫対策

ハウス周辺の環境変化(除草、防除)により、害虫がハウス内へ飛び込むため、周辺環境にも気をつける。

害虫対策に**バイオアクト TS 50~100 cc/10a(又は、ストップ・雅 200~300 cc/10a)**を5~7日毎に灌水する。

その後、防除時に**バイオアクト TS 2000~3000 倍(又は、ストップ・雅 500~1,000 倍)**を混用する。

追肥(液肥)

土壌環境、並びに年数、根の働きによっても増減する。

プロ液肥 5~10 L/10a

時を越えた贈り物 100~200 cc/10a

サンミネーラ 50 cc/10a

バイオアクト TS(又はストップ・雅) 50cc(100cc)/10a

5~10 日ごとに灌水する場合

※収穫量や土壌条件、天候によって加減する。

※サンミネーラの代わりにシリアップ 100~150 cc、シマロックス 500~1000 cc、海藻のエキス 50g でもよい。

ご注文やお問い合わせは、

有限会社 丸 富 0942 - 65 - 0123 (TEL)

FAX 0942-65-1091 (24 時間受付) 携帯 090-3328-7603 (富松まで)