

アスパラガス栽培管理(R7.9.)

(有) 丸 富

8 月は前半が猛暑・干ばつで、高温障害による光合成の低下、高温時の防除による薬害、害虫の発生、株の生育が悪かった。後半は各地で豪雨災害や病害虫の発生が多かった。遠日点で根の働きが悪かった。

樹勢回復

猛暑による樹勢低下を回復させ、来季のために(貯蔵養分蓄積に)光合成を促進する。

樹勢回復に**笑顔 1,000 倍(又は、天地の恵み 500 倍)**と**サンミネーラ 10,000 倍**を数回、葉面散布する。

貯蔵養分蓄積

側枝や二次側枝の発生を抑えて、貯蔵養分を徐々に蓄積する。通気性を良くし、ハウス内の温度を抑え、光合成を促進する。

貯蔵養分蓄積に**時を越えた贈り物 1,000 倍**と**酸カル 2,000 倍**と**サンミネーラ 5,000 倍**を防除時に混用する。

害虫対策

周りの作物が色づき収穫期を迎えると、ハウス周辺の害虫がハウス内へ飛び込むことがある。

害虫対策に**バイオアクト TS 50～100 cc/10a(又は、ストップ・雅 200～300 cc/10a)**を灌水する。

防除時は先ず上記を灌水し、害虫を追い出し、その後防除を行う。防除時に**バイオアクト TS 2000～3000 倍(又は、ストップ・雅 500～1,000 倍)**を混用する。

品質向上

樹勢が低下して細根の働きが悪い時は、光合成の向上を図り、根の養分吸収を促進する。

光合成促進に**時を越えた贈り物 1,000 倍**と**酸カル 2,000 倍**と**サンミネーラ 10,000 倍**を連続散布する。

品質向上に**時を越えた贈り物 200 cc/10a**と**酸カル 100 cc/10a**と**サンミネーラ 50 cc/10a**を液肥に混用すると、既存の肥料の吸収効率が向上する。

発根促進

遠日点では細根の働きが悪いため、発根促進を行い、吸収根(細根)を積極的に維持する。

発根促進に**グリンスター(発根力)500 cc/10a**と**G バランス DF 1 kg/10a**を 30～45 日ごとに灌水する。

追肥(液肥)

土壌環境、並びに年数、根の働きによっても増減する。

プロ液肥 5～10 ℓ/10a

時を越えた贈り物 100～200 cc/10a

サンミネーラ 50 cc/10a

バイオアクト TS(又はストップ・雅) 50cc(100cc)/10a

5～10 日ごとに灌水する場合

※収穫量や土壌条件、天候によって加減する。

※サンミネーラの代わりにシリアップ 100～150 cc、シーマックス 500～1000 cc、海藻のエキス 50g でもよい。

ご注文やお問い合わせは、

有限会社 丸 富 0942 - 65 - 0123 (TEL)

FAX 0942-65-1091 (24 時間受付) 携帯 090-3328-7603 (富松まで)