アスパラガス栽培管理 (R7.10.)

(有) 丸 富

9月前半は残暑厳しく、前線を伴った低気圧が通過し、線状降水帯を発生、各地で災害が発生した。後半は朝晩が少し涼しくなったが、日中は猛暑でハウス内温度が高いままだった。病虫害の発生はやや少なかった。

品質向上

気温が低下して細根の働きが良くなったら、光合成を促進し、根の養分吸収を促進する。

光合成促進に**時を越えた贈り物 1,000 倍**と**酸カル 2,000 倍**と**サンミネーラ 10,000 倍**を連続散布する。

品質向上に**時を越えた贈り物 200 cc/10a**と**酸カル 100 cc/10a**と**サンミネーラ 50 cc/10a**を液肥に混用すると、既存の肥料や土壌中に残留する肥料の吸収効率が向上する。

貯蔵養分蓄積

収穫が終わったら、ハウス内の温度を下げて、若茎の発生を抑える。若茎や側枝、二次側枝の発生を抑えて、根に貯蔵養分を蓄積する。

貯蔵養分蓄積に**時を越えた贈り物 1,000 倍**と**酸カル 2,000 倍**と**サンミネーラ 5,000 倍**を防除時に混用する。

害虫対策

近日点では害虫の発生が多くなるので、ハウス周辺の害虫がハウス内へ飛び込むことがある。

害虫対策に**バイオアクト TS 50~100 cc/10a**(又は、**ストップ・雅 200~300 cc/10a**)を灌水する。

防除時は先ず上記を灌水し、害虫を追い出し、その後防除を行う。防除時に**バイオアクト TS 2000~3000 倍**(又は、**ストップ・雅 500~1,000 倍**)を混用する。

黄化促進

近年、毎年残暑が厳しいので、黄化し難い状況が続いている。来季のために黄化を促進する。

黄化促進に**酸カル**(又は、**時を越えた贈り物**) **1,000 倍**と**サンミネーラ 3,000 倍**を数回、葉面散布する。

発根促進

近日点では根の働きが良いので、発根促進を行い、積極的に根量を増やす。

発根促進に**グリンスター**(又は、**発根力**)**500 cc/10a**と**G バランス DF 1 kg/10a**を灌水する。

追肥(液肥)

土壌環境、並びに年数、根の働きによっても増減する。

プロ液肥 1~2 ℓ /10a

時を越えた贈り物 100~200 cc/10a

サンミネーラ 50 cc/10a

バイオアクト TS(又は**ストップ・雅**) 50cc(100cc)/10a

5~10 日ごとに灌水する場合

※収穫量や土壌条件、天候によって加減する。

※サンミネーラの代わりにシリアップ 100~150 cc、シーマックス 500~1000 cc、海藻のエキス 50g でもよい。

ご注文やお問い合わせは、

有限会社 丸 富 0942 - 65 - 0123 (TEL)

FAX 0942-65-1091 (24 時間受付) 携帯 090-3328-7603 (富松まで)