

アスパラガス栽培管理(R8.1.)

(有) 丸 富

12月は時々記録的な高温になるくらい暖かく、ハウス内は温度が上がった。アスパラガスの収穫はないものの、ハウス周辺ではダニやアサミウマ、カビなど病害虫の発生がいつまでも続いた。低温遭遇が少ない状態が続いた。

害虫対策

近日点で害虫の発生が多かったので、害虫が越冬することがある。土づくり前にバーナー焼却(殺虫)を徹底して、害虫を抑制する。

害虫対策に**バイオアクト TS 50~100 cc/10a(又は、ストッパー雅 200~300 cc/10a)**を灌水する。

防除時は先ず上記を灌水し、害虫を追い出し、その後防除を行う。防除時に**バイオアクト TS 2000~3000倍(又は、ストッパー雅 500~1,000倍)**を混用する。

病害対策

病害の発生が少ないよう、バーナー焼却(殺菌)によって、病害の発生を抑制する。

病害対策に**農業用植物マグマ 500g~1 kg/10a** と**ハイプロ 3~5袋/10a**を土壤施肥する。

土づくり

作物づくりは土づくりで決まる！と言うくらい大事なことなので、圃場の状態を知るために、土壤分析などを行う。それを基に圃場に適した施肥設計を行う。

蒸し込み前

土づくりが終わったら、養分吸収が良いように、微生物と微量元素を与えてから蒸し込む。

蒸し込み前に**時を越えた贈り物(又は、天地の恵み) 1ℓ/10a** と**サンミネーラ 100 cc/10a**を灌水する。

萌芽促進

蒸し込み後、萌芽が始まったら、萌芽を促進するよう、散水、又は葉面散布を行う。

萌芽促進に**天地の恵み(又は、笑顔) 1,000倍** と**サンミネーラ 10,000倍**を数回、散水又は葉面散布する。

追肥(液肥)

土壤環境、並びに年数、根の働きによっても増減する。

プロ液肥	0.1~0.2 ℥/10a	5~10日ごとに灌水する場合 ※収穫量や土壤条件、天候によって 加減する。
時を越えた贈り物	100~200 cc/10a	
サンミネーラ	50 cc/10a	
バイオアクト TS(又はストッパー雅)	50cc(100cc)/10a	

※サンミネーラの代わりにシリカアップ 100~150 cc、シーマロックス 500~1000 cc、夢源の雫 20~30 ccでもよい。

ご注文やお問い合わせは、

有限会社 丸 富 0942-65-0123 (TEL)

FAX 0942-65-1091 (24時間受付) 携帯 090-3328-7603 (富松まで)