

いちご栽培管理 (R8.4.)

(有) 丸 富

3月も前半は雨が少なく、後半の雨でやや潤った。日中のハウス内は3月なのに、夏のような暑さだった。高温により、一部でダニやスリップスなど害虫の発生が急に多くなった。高温による果実の軟化など品質が低下した。

軟果対策

気温が上がると、果実温度が上がると、果実が軟果する。できる限り低温で管理し、軟果を抑制する。
軟果対策に**酸カル 100 cc/10a** と **サンミネーラ 50 cc/10a** と **夢源の雫 10 cc/10a** を灌水する。

害虫対策

近日点では特に満月頃は害虫の発生が急に多くなるので、ハウス周辺の環境変化に注意する。
害虫やねぐ対策に**バイオアクトTS 50~100 cc/10a** を5~7日毎に灌水、散水する。
防除前に**バイオアクトTS 100 cc/10a** を灌水し、その後に**バイオアクトTS 2,000倍** を混ぜて防除する。

着色抑制

積算温度が上がると、着色が早くなる。着色を抑制するには出来る限り冷やして、積算温度を下げる。

肥大促進

近日点では微量元素やK、Ca等が吸収しやすいので、K、Ca等の吸収効率が向上する。
果実肥大に**K元気サポート 250g/10a** と **酸カル 100 cc/10a** と **サンミネーラ 50 cc/10a** を灌水する。

根張り対策

近日点では根の働きが良いので、発根を促進し、養分吸収を維持する。
発根促進に**発根力 1ℓ(酸カル 300~500 cc)/10a** と **GバランスDF 1 kg/10a** を灌水する。

病害対策

近日点では病害の発生が少ないが、新月過ぎはウドンコ病やねぐ病が発生しやすいので、注意する。
窒素消化促進に**時を越えた贈り物 1,000倍** と **酸カル 2,000倍** と **サンミネーラ 10,000** を防除時に混用する。

追肥(液肥)

施用量は肥料、土質、樹勢、環境などによって加減する。

プロ液肥	2~3 kg/10a	} 5~7日毎に灌注、散水する場合 ※状況に応じて加減する
時を越えた贈り物(天地の恵み)	100~200 cc/10a	
サンミネーラ	50~100 cc/10a	
バイオアクトTS	70~100 cc/10a	

※サンミネーラの代わりにシカアップ 100~200 cc、夢源の雫 20~30 cc、海藻のエキス 50~100 g でもよい。

ご注文やお問い合わせは、

有限会社 丸 富 TEL (0942) 65-0123

FAX0942-65-1091 (24時間受付)

携帯 090-3328-7603 (富松まで)