

# アスパラガス栽培管理 (R8.4.)

(有) 丸 富

3月前半は雨が少なく、日中のハウス内は3月としては暑い日が多かった。気温が高い時はハウス内の温度がかなり上がったので、地温も上がり、収穫量も増加した。気温が上がると害虫の発生も多くなった。

## 伸長促進

生長点の樹液濃度(糖度)を上げると、若茎の伸長が促進する。

伸長促進に**天地の恵み (又は、笑顔) 1,000 倍**と**サンミネーラ 10,000 倍**を数回、葉面散布又は散水する。

## 緑化促進

立茎後はできる限り緑化を促進し、光合成能力を高め、展開(展葉)を促す。

緑化促進に**酸カル 2,000 倍**と**サンミネーラ 10,000 倍**を葉面散布する。

## 品質向上

アスパラガスが好んだ養分を吸収するので、微量要素不足になり、偏平や曲がりが多くなる。

微量要素不足になる前に**酸カル 100 cc/10a**と**サンミネーラ 50 cc/10a**を5~10日毎に灌水する。

## 発根促進

近日点では根がよく働くので、発根を促し、根の活性を高める。

発根促進と細根の維持に**酸カル 300 cc/10a**と**Gバランス DF 1 kg/10a**を1ヶ月毎に灌水する。

## 病害対策

近日点では生殖生長するので、窒素消化が良く、病害の発生がやや少ない。

病害対策に**時を越えた贈り物 2,000 倍**と**サンミネーラ 10,000 倍**を葉面散布する。※防除時混用可

## 害虫対策

近日点では害虫の発生が多い。特に満月頃は害虫の発生に、要注意。

害虫対策に**バイオアクト TS 50~100 cc/10a (又は、ストップ-雅 200~300 cc/10a)**を灌水する。

防除時は上記を灌水し、害虫を追い出す。その後、防除時に**バイオアクト TS 2,000~3,000 倍**を混用。

## 追肥(液肥)

土壤環境、並びに年数、根の働きによっても増減する。

プロ液肥 3~5 ℓ /10a

時を越えた贈り物 100~200 cc/10a

サンミネーラ 50 cc/10a

バイオアクト TS (又はストップ-雅) 50cc (100cc) /10a

5~10 日ごとに灌水する場合

※収穫量や土壤条件、天候によって  
加減する。

※サンミネーラの代わりにシマロックス 500~1000 cc、シカアップ 200 cc、夢源の雫 20~30 cc でもよい。

ご注文やお問い合わせは、

有限会社 丸 富 0942 - 65 - 0123 (TEL)

FAX 0942-65-1091 (24 時間受付) 携帯 090-3328-7603 (富松まで)