

アスパラガス栽培管理 (R8.4.)

(有) 丸 富

4 月は時折夏のような暑さもあり、ダニやスリップスなど害虫の発生が比較的多かった。朝晩の冷え込みが影響して収穫量が伸び悩んだ。また、曇天が続き、暖かい雨風が強くと、加ヒ病の発生も一部であった。

緑化促進

生育中はできる限り緑化を促進し、光合成能力を高め、茎葉の充実を図る。

緑化促進に**酸カル 2,000 倍**と**サンミネーラ 10,000 倍**を葉面散布する。

品質向上

好んだ養分だけを吸収すると、養分の偏りや不足が発生し、偏平や曲がりが多くなる。

養分不足になる前に**酸カル 100 cc/10a**と**サンミネーラ 50 cc/10a**を5~10日毎に灌水する。

伸長促進

茎葉の光合成を促進すると、根の働きがよくなり、若茎の伸長が促進する。

伸長促進に**時を越えた贈り物 2,000 倍**と**酸カル 2,000 倍**と**サンミネーラ 10,000 倍**を散布又は灌注する。

発根促進

近日点では根の働きが良いので、発根を促し、根の活性を高める。

発根促進と細根の維持に**酸カル 300 cc/10a**と**G バランス DF 1 kg/10a**を1ヶ月毎に灌水する。

病害対策

近日点では生殖生長するので、窒素消化が良く、病害の発生がやや少ない。

病害対策に**時を越えた贈り物 2,000 倍**と**サンミネーラ 10,000 倍**を葉面散布する。※防除時混用可

害虫対策

近日点では害虫の発生が多い。特に満月頃は害虫の発生に、要注意。

害虫対策に**バイオアクト TS 50~100 cc/10a(又は、ストップ-雅 200~300 cc/10a)**を灌水する。

防除時は上記を灌水し、害虫を追い出す。その後、防除時に**バイオアクト TS 2,000~3,000 倍**を混用。

追肥(液肥)

土壌環境、並びに年数、根の働きによっても増減する。

プロ液肥 3~5 ℓ /10a

時を越えた贈り物 100~200 cc/10a

サンミネーラ 50 cc/10a

バイオアクト TS(又はストップ-雅) 50cc(100cc)/10a

5~10 日ごとに灌水する場合

※収穫量や土壌条件、天候によって加減する。

※サンミネーラの代わりにシマロックス 500~1000 cc、シカアップ 200 cc、夢源の雫 20~30 cc でもよい。

ご注文やお問い合わせは、

有限会社 丸 富 0942 - 65 - 0123 (TEL)

FAX 0942-65-1091 (24 時間受付)

携帯 090-3328-7603 (富松まで)