

いちご栽培管理 (R8.5.)

(有) 丸 富

4 月は時折夏のような暑さもあり、ダニやスリップスなど害虫の発生が多く、なり疲れの影響で収穫量が伸び悩んだ。また、曇天が続くときもあり、暖かい雨風が強くと、加^ハ病やウ^ンコ病の発生も一部であった。

軟果対策

できる限り果実温度が上がる前に収穫する。

軟果対策に**酸カル 100 cc/10a**と**サンミネーラ 50 cc/10a**と**夢源の雫 10 cc/10a**を灌水する。

害虫対策

近日点では満月頃に害虫の発生が多くなるので、ハウス周辺の環境変化に注意する。

害虫やネ^グ対策に**バイオアクトTS 50~100 cc/10a**を5~7日毎に灌水、散水する。

防除前に**バイオアクトTS 100 cc/10a**を灌水し、その後に**バイオアクトTS 2,000 倍**を混ぜて防除する。

ランナーの発生促進

近日点ではランナーの発生がやや少ないので、追肥や散水、灌水を行い、ランナーの発生を促進する。

ランナーの発生促進に**天地の恵み 500 倍**と**サンミネーラ 10,000 倍**を散水、灌水する。

防除時に**天地の恵み 1,000 倍**と**サンミネーラ 10,000 倍**を混用する。

親苗の根張り促進

親苗の根の働きを良くすることで、健全なランナーの発生を促進する。

発根促進に**酸カル 1,000~2,000 倍**と**G バランス DF 5000 倍**を灌注、散水する。

根張り促進に**農業用植物マグマ粉末 0.1~0.2g/ポット**を株元に撒く。

病害対策

近日点では病害の発生は少ないが、新月過ぎは苗にウ^ンコ病や加^ハ病が発生しやすいので、注意する。

窒素消化促進に**時を越えた贈り物 2,000 倍**と**酸カル 2,000 倍**と**サンミネーラ 10,000**を防除時に混用する。

追肥(液肥)

施用量は肥料、土質、樹勢、環境などによって加減する。

プロ液肥	2~3 kg/10a	} 5~7 日毎に灌注、散水する場合 ※状況に応じて加減する
時を越えた贈り物(天地の恵み)	100~200 cc/10a	
サンミネーラ	50~100 cc/10a	
バイオアクト TS	70~100 cc/10a	

※サンミネーラの代わりにシカアップ 100~200 cc、夢源の雫 20~30 cc、海藻のエキス 50~100 g でもよい。

ご注文やお問い合わせは、

有限会社 丸 富 TEL (0942) 65-0123

FAX 0942-65-1091 (24 時間受付)

携帯 090-3328-7603 (富松まで)