

# いちご栽培管理 (R8.6.)

(有) 丸 富

5月は近日点で花が連続して出蕾したため、出荷が終わるまでイチゴがたくさん実った。雨が少なく、夏のような暑さになり、ダニやスリップスなど害虫の発生が多かった。また、近日点なので、ランナーの発生がやや少なかった。

## ランナーの発生促進

近日点ではランナーの発生がやや少ないので、追肥や散水、灌水を行い、ランナーの発生を促進する。

ランナーの発生促進に**天地の恵み 1,000倍**と**サンミネーラ 10,000倍**を散水、又は灌水する。

防除時に**天地の恵み 2,000倍**と**サンミネーラ 10,000倍**を混用する。

## 根張り促進

根の働きを良くすることで、健全なランナーを育成できる。

発根促進に**酸カル 1,000～2,000倍**と**GバランスDF 5000倍**を灌注、散水する。

根張り促進に**農業用植物マグマ粉末 0.1～0.2g/ポット**を株元に撒く。

## 不時出蕾抑制

近日点では花芽分化しやすいので、切り離し時の養分不足やショックなどにより、不時出蕾が発生しやすい。

親苗からランナーを切り離す前に、置き肥をして、養分(肥料)が効いた状態で、親苗から切り離す。

## 害虫対策

近日点では満月頃に害虫の発生が多くなるので、苗床周辺の環境変化に注意する。

害虫対策に**バイオアクトTS 50～100 cc/10a**を5～7日毎に灌水、散水する。

防除前に**バイオアクトTS 100 cc/10a**を灌水し、その後に**バイオアクトTS 2,000倍**を混ぜて防除する。

## 病害対策

近日点では病害の発生は少ないが、新月過ぎは徒長苗にウドン病などが発生しやすいので、注意する。

窒素消化促進に**時を越えた贈り物 2,000倍**と**酸カル 2,000倍**と**サンミネーラ 10,000**を防除時に混用する。

## 追肥(液肥)

施用量は肥料、土質、樹勢、環境などによって加減する。

プロ液肥	0.5～1 kg/10a	} 5～7日毎に灌注、散水する場合 ※状況に応じて加減する
時を越えた贈り物(天地の恵み)	100～200 cc/10a	
サンミネーラ	50～100 cc/10a	
バイオアクトTS	70～100 cc/10a	

※サンミネーラの代わりにシカアップ<sup>®</sup> 100～200 cc、夢源の雫 20～30 cc、海藻のエキス 50～100 gでもよい。

ご注文やお問い合わせは、

有限会社 丸 富 TEL (0942) 65-0123

FAX **0942-65-1091** (24時間受付)

携帯 090-3328-7603 (富松まで)