

# アスパラガス栽培管理 (R8.6.)

(有) 丸 富

5月は雨が少なく夏のような暑さになり、ダニやスリップスなど害虫の発生が比較的多かった。日中は暑い、朝晩は比較的涼しく、近日点で収穫量は順調だった。また、近日点で病害の発生は比較的少なかった。

## 品質向上

作物が好む養分を多く吸収するので、養分の偏りや不足が発生し、偏平や曲がりが多くなる。  
養分不足になる前に**酸カル 100 cc/10a** と **サンミネーラ 50 cc/10a** を 5~10日毎に灌水する。

## 発根促進

近日点では根の働きが良いので、発根を促すと、土壤中の養分を効率よく吸収できる。  
発根促進と細根の維持に**酸カル 300 cc/10a** と **G バランス DF 1 kg/10a** を 1ヶ月毎に灌水する。

## 緑化促進

生育中はできる限り緑化を促進し、光合成能力を高め、茎葉の充実を図る。  
緑化促進に**酸カル 2,000 倍** と **サンミネーラ 10,000 倍** を葉面散布する。

## 伸長促進

茎葉の光合成を促進すると、浸透圧により、根の働きがよくなり、若茎の伸長が促進する。  
伸長促進に**時を越えた贈り物 2,000 倍** と **酸カル 2,000 倍** と **サンミネーラ 10,000 倍** を散布又は灌注する。

## 病害対策

過繁茂状態になると、風通しが悪く病害の発生が多くなる。適度な状態を維持できる手入れが大切。  
病害対策に**時を越えた贈り物 2,000 倍** と **サンミネーラ 10,000 倍** を葉面散布する。※防除時混用可

## 害虫対策

近日点では害虫の発生が多い。特に満月頃は害虫の発生に、要注意。  
害虫対策に**バイオアクト TS 50~100 cc/10a(又は、ストップアーク 200~300 cc/10a)** を灌水する。  
防除時は上記を灌水し、害虫を追い出す。その後、防除時に**バイオアクト TS 2,000~3,000 倍** を混用。

## 追肥(液肥)

土壤環境、並びに年数、根の働きによっても増減する。

プロ液肥	3~5 ℓ /10a	} 5~10日ごとに灌水する場合 ※収穫量や土壤条件、天候によって 加減する。
時を越えた贈り物	100~200 cc/10a	
サンミネーラ	50 cc/10a	
バイオアクト TS(又はストップアーク)	50cc(100cc)/10a	

※サンミネーラの代わりにシマロックス 500~1000 cc、シカアップ 200 cc、夢源の雫 20~30 cc でもよい。

ご注文やお問い合わせは、

有限会社 丸 富 0942 - 65 - 0123 (TEL)

FAX 0942-65-1091 (24 時間受付) 携帯 090-3328-7603 (富松まで)