

アスパラガス栽培管理(R8.8.)

(有) 丸 富

7 月前半は線状降水帯を伴う大雨に見舞われたが、災害はなかった。7 月後半はまったく降雨がなく、梅雨明け後は干ばつで猛暑(酷暑)だった。害虫の発生が多かったが、酷暑で手入れができる状況ではなかった。

伸長促進

猛暑下では光合成が低下する。光合成を促進して、根の働きを高め、養分吸収を促進する。

伸長促進に**時を越えた贈り物 2,000 倍**と**酸カル 2,000 倍**と**サンミネーラ 5,000 倍**を散布又は灌注する。

品質向上

高温下で根の働きが悪く、養分の偏りや養分不足が発生し、偏平や曲がりが多くなる。

転流効率改善に**酸カル 100～200 cc/10a**と**サンミネーラ 50～100 cc/10a**を 5～10 日毎に灌水する。

病害対策

空気がこもって、病害が発生することが多いので、適度な手入れを行い、通気性を維持する。

病害対策に**時を越えた贈り物 2,000 倍**と**酸カル 2,000 倍**と**サンミネーラ 10,000 倍**を(防除時に)散布する。

緑化促進

曇天や長雨で日照不足の時は、光合成能力を高め、緑化を促進し、茎葉の充実を図る。

緑化促進に**酸カル 1,000 倍**と**サンミネーラ 5,000 倍**を葉面散布する。

害虫対策

遠日点は害虫の発生が少ないが、ハウス周辺の環境変化に注意する。満月頃は害虫の発生に注意する。

害虫対策に**バイオアクト TS 50～100 cc/10a(又は、ストップ・雅 200～300 cc/10a)**を灌水する。

防除時は上記を灌水し、害虫を追い出す。その後、防除時に**バイオアクト TS 2,000～3,000 倍**を混用。

発根促進

遠日点では細根の働きが悪いので、P、K、Mg、Ca や微量元素などの養分吸収が低下する。

発根促進と細根の維持に**酸カル 300 cc/10a**と**G バランス DF 1 kg/10a**を 1 ヶ月毎に灌水する。

追肥(液肥)

土壌環境、並びに株の年数、根の働きによっても増減する。

プロ液肥	5～7 ℓ /10a	} 5～10 日ごとに灌水する場合 ※収穫量や土壌条件、天候によって 加減する。
時を越えた贈り物	100～200 cc/10a	
サンミネーラ	50 cc/10a	
バイオアクト TS(又はストップ・雅)	50cc(100cc)/10a	

※サンミネーラの代わりにシマロックス 500～1000 cc、シカアップ 200 cc、夢源の雫 20～30 cc でもよい。

ご注文やお問い合わせは、

有限会社 丸 富 0942 - 65 - 0123 (TEL)

FAX 0942-65-1091 (24 時間受付) 携帯 090-3328-7603 (富松まで)