

アスパラガス栽培管理(R8.10.)

(有) 丸 富

9月は関東では1か月雨が続き、千葉では線状降水帯を伴う大雨で3回(8月も含む)も被害が出た。8月の高温の影響で収穫皆無になって早く終わった方もあった。関東では長雨でかび病の発生により収穫皆無に。

樹勢回復

曇天や長雨による日照不足で、樹勢が低下している場合は、黄化する前に樹勢回復を図る。

樹勢回復に**笑顔(又は天地の恵み) 1,000倍**と**サンミネーラ 5,000倍**を葉面散布、又は防除時に混用する。

貯蔵養分蓄積

光合成で出来た光合成産物を葉から根に転流し、蓄積する。

養分蓄積に**時を越えた贈り物 2,000倍**と**酸カル 2,000倍**と**サンミネーラ 10,000倍**を防除時混用散布する。

発根促進

遠日点で根の働きが悪いので、葉面散布で根の働きを活発にする。

根の活力向上に**時を越えた贈り物 1,000倍**と**サンミネーラ 10,000倍**を葉面散布、又は防除時に混用する。

発根促進と細根の維持に**酸カル 300 cc/10a**と**Gバランス DF 1 kg/10a**を1ヶ月毎に灌水する。

品質向上

遠日点では細根の働きが悪く、養分吸収の偏りや養分不足が発生し、偏平や曲がりが多くなる。

品質の向上に**酸カル 100 cc/10a**と**サンミネーラ 50 cc/10a**を5~10日毎に灌水する。

病害対策

病害の発生を抑えるには、通気性を維持するよう、適度な手入れを行う。

病害対策に**時を越えた贈り物 2,000倍**と**酸カル 2,000倍**と**サンミネーラ 10,000倍**(防除時に)散布する。

害虫対策

遠日点では害虫の発生がやや少ないが、環境変化に注意する。満月頃は害虫の発生に注意する。

害虫対策に**バイオアクト TS 50~100 cc/10a(又は、ストップ・雅 200~300 cc/10a)**を灌水する。

防除時は上記を灌水し、害虫を追い出す。その後、防除時に**バイオアクト TS 2,000~3,000倍**を混用。

追肥(液肥)

土壌環境、並びに株の年数、根の働きによっても増減する。

プロ液肥 0.5~1 g/10a

酸カル 50~100 cc/10a

サンミネーラ 50 cc/10a

バイオアクト TS(又はストップ・雅) 50cc(100cc)/10a

5~10日ごとに灌水する場合

※収穫量や土壌条件、天候によって
加減する。

※サンミネーラの代わりにシマロックス 500~1000 cc、シカアップ 200 cc、夢源の雫 20~30 ccでもよい。

ご注文やお問い合わせは、

有限会社 丸 富 0942 - 65 - 0123 (TEL)

FAX 0942-65-1091 (24 時間受付) 携帯 090-3328-7603 (富松まで)