

野菜(トマト・ナス)栽培管理 (R8.10.) (有) 丸 富

9月は関東では1か月雨が続き、千葉では線状降水帯を伴う大雨で3回(8月も含む)も被害が出た。近年9月に入っても暑い日が続いていたので、今年は比較的涼しく定植後の生育も順調だった。害虫が一部で発生した。

発根促進

遠日点では細根の働きがやや悪いので、定植後は葉面散布を活用して、根の働きを活発にする。
発根促進に **Gバランス DF 1 kg/10a** と **酸カル 200~300 cc(又は、発根力 1ℓ)/10a** を灌水する。
根の働き強化に **笑顔 1,000 倍(又は、天地の恵み 500 倍)** と **サンミネーラ 10,000 倍** を葉面散布する。

品質向上

細根の働きがやや悪い遠日点では、根から養分を吸収しにくいので、葉面散布で養分を補給する。
品質向上に **酸カル 1,000 倍** と **サンミネーラ 5,000 倍** を葉面散布する。

日照不足対策

日照不足が続くと、光合成産物が少なく、生育が遅れるので、光合成を促進するよう葉面散布を行う。
光合成促進に **笑顔 1,000 倍(又は、天地の恵み 500 倍)** と **サンミネーラ 10,000 倍** を葉面散布する。

着(花)果促進

遠日点の新月頃は栄養生長傾向になるので、着花(果)不良に注意する。
着花(果)促進に **時を越えた贈り物 1,000 倍** と **酸カル 2,000 倍** と **サンミネーラ 10,000 倍** を葉面散布する。

病害対策

遠日点では病害の発生がやや多くなる。特に新月頃はうどんこ病や尻腐病などの発生に注意する。
窒素消化に **時を越えた贈り物 2,000 倍** と **酸カル 2,000 倍** と **サンミネーラ 5,000 倍** を葉面散布する。

害虫対策

遠日点では害虫の発生はやや少ないが、満月頃は害虫の発生に注意する。
害虫の事前対策に **バイオアクト TS 50~100 cc/10a** を5~7日毎に灌水する。
防除前に **バイオアクト TS 50~100 cc/10a** を灌水して、害虫を追い出した後に、農薬防除を行う。

追肥(液肥)

土質や生育状況、環境、肥培管理によって増減する。

時を越えた贈り物(又は天地の恵み)	100~200 cc/10a	} 5~7 日毎に灌水する場合 ※生育状況によって加減する。
サンミネーラ	50~70 cc/10a	
酸カル(又は天然ミネラル)	50~100 cc/10a	
バイオアクト TS	50~70 cc/10a	

※サンミネーラの代わりに、夢源の雫 20~30 cc、海藻のエキス 50g、シカアップ 100~150 ccでもよい。

ご注文やお問い合わせは、 有限会社 丸 富 TEL (0942) 65-0123

FAX **0942-65-1091** (24 時間受付) 携帯 090-3328-7603 (富松まで)